

Протоколы лечения COVID-19 в странах Европы

Категория пациентов	Италия	Франция	Нидерланды	Бельгия	Швейцария
Легкая и средняя тяжесть/не относятся к группам риска	Без противовирусной терапии				
Легкая и средняя тяжесть/относятся к группам риска	Калетра + плаквенил	Калетра	Плаквенил	Плаквенил	Плаквенил
Тяжелое течение	Ремдисивир + плаквенил	Ремдисивир	Плаквенил	Плаквенил	Ремдисивир
Критическое состояние	Ремдисивир + плаквенил	Ремдисивир	Ремдисивир	Ремдисивир	Ремдисивир

Назначение калетры рассматривается как лечение второго ряда у пациентов с непереносимостью плаквенила или при отсутствии ремдисивира

Протокол ведения пациентов с коронавирусной инфекцией в КНР (6 пересмотр)

- альфа-интерферон (5 млн ЕД ингаляционно)
- лопинавир/ритонавир (200 мг/50 мг 2 раза по 2 таб., не более 10 дней)
- рибавирин (500 мг 2-3 раза в/в, не более 10 дней)
- хлорохина фосфат (500 мг 2 раза в день, не более 10 дней)
- арбидол (200 мг 3 раза в день, не более 10 дней)