



Микаелян Анжела Артуровна

Тема: Роль висцерального ожирения в развитии хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса

Цель исследования: изучить взаимосвязь между особенностями распределения жировой ткани, уровнями адипокинов и окситоцина в сыворотке крови и структурно-функциональными изменениями миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СНсФВ) и ожирением.

Задачи исследования:

1. Оценить толщину и объем висцеральной жировой ткани (ВЖТ) у пациентов обоего пола с СНсФВ и ожирением.
2. Установить структурно-функциональные особенности геометрии левого желудочка у пациентов обоего пола с СНсФВ и ожирением.
3. Определить уровни адипокинов (оментина-1, висфатина, лептина, адипонектина), маркеров воспаления (вчСРБ, ИЛ-1 β , ИЛ-6, ФНО- α), NT-proBNP и окситоцина в сыворотке крови у пациентов СНсФВ и ожирением.
4. Изучить взаимосвязь между уровнем биомаркеров в сыворотке крови, объемом ВЖТ и выраженностью ремоделирования миокарда ЛЖ у пациентов с СНсФВ на фоне ожирения.

Мощность исследования:

120 пациентов в возрасте от 60 до 74 лет:

- А) 60 пациентов с СНсФВ и ожирением
- Б) 60 пациентов с СНсФВ без ожирения

Срок предоставления диссертационной работы: июнь 2024