

Анатомо-физиологические особенности ребенка. Уход.

1. Средняя длина тела новорожденного составляет:

- а) 45-47 см
- б) 48-49 см
- в) 50-51 см
- г) 52- 54 см

Правильный ответ: в

2. Средняя масса тела доношенного новорожденного ребенка составляет:

- а) 2500-2700 г
- б) 2900-3100 г
- в) 3300-3500 г
- г) 3700-3900 г

Правильный ответ: в

3. Массо-ростовой показатель у доношенного новорожденного ребенка в среднем составляет:

- а) 40-50
- б) 50-60
- в) 60-80
- г) 80-90

Правильный ответ: в

Вскармливание

4. Состав молозива по сравнению со зрелым женским молоком:

- а) белка больше
- б) углеводов больше
- в) жира больше
- г) энергетическая ценность больше

Правильный ответ: а

5. В женском молоке по сравнению с коровьим:

- а) количество белков ниже
- б) количество белков выше
- в) преобладают крупнодисперсные белки
- г) уровень аминокислот ниже

Правильный ответ: а

6. В женском молоке по сравнению с коровьим:

- а) количество жиров ниже
- б) количество жиров такое же
- в) меньше ненасыщенных жирных кислот
- г) уровень холестерина ниже

Правильный ответ: б

Желтухи

7. Причины физиологической желтухи:

- а) гемолиз
- б) снижение активности глюкуронилтрансферазы
- в) снижение активности глюкуронилтрансферазы и гипоальбуминемия
- г) снижение активности глюкуронилтрансферазы, гипоальбуминемия, гемолиз

Правильный ответ: г

8. При гипербилирубинемии новорожденных возможно развитие ядерной желтухи, если уровень непрямого билирубина при нормальном уровне белка повысится до:

- а) 50 мкмоль/л
- б) 150 мкмоль/л
- в) 250 мкмоль/л
- г) 340 мкмоль/л

Правильный ответ: г

Хронические расстройства питания.

9. Внутриутробной гипотрофией новорожденного считается:

- а) дефицит массы тела по отношению к сроку гестации
- б) дефицит длины тела по отношению к сроку гестации
- в) дефицит массы тела по отношению к длине тела
- г) масса тела при рождении меньше 3000 г

Правильный ответ: в

10. Дефицит массы при 1 степени постнатальной гипотрофии составляет:

- а) 5-8%
- б) 5-15%

в) 10-20%

г) 20-30%

Правильный ответ: в

11. Дефицит массы при III степени постнатальной гипотрофии составляет:

а) 5-10%

б) 10-20%

в) 20-30%

г) более 30%

Правильный ответ: г

Острые расстройства питания.

12. Какие признаки можно рассматривать, как симптомы обезвоживания:

а) снижение тургора тканей

б) полиурия

в) ригидность затылочных мышц

г) опрелость межягодичных складок

Правильный ответ: а

13. Какой продолжительности паузу в приеме пищи назначите ребенку 3-х месяцев с признаками обезвоживания и токсикоза I степени, развившихся вследствие рвоты и поноса:

а) на 3 часа

б) на 6 часов

в) на 9 часов

г) на 12 часов

Правильный ответ: б

14. 1- месячный ребенок поступил с жалобами матери на ежедневную рвоту фонтаном с 20 дневного возраста. В правом верхнем квадранте живота пальпируется плотное образование 1,5 см на 0,8 см. Какой наиболее вероятный диагноз у этого ребенка:

а) врожденный пилоростеноз

б) нефробластома

в) муковисцидоз

г) диафрагмальная грыжа

Правильный ответ: а

Гнойно-септические заболевания.

15. Эпидемическая пузырчатка новорожденных характеризуется наличием:

- а) вялых пузырей
- б) напряженных пузырей
- в) везикул
- г) папулезной сыпи

Правильный ответ: а

16. Гнойный омфалит новорожденных характеризуется:

- а) серозным отделяемым из пупочной раны
- б) положительным симптомом Краснобаева
- в) отеком и гиперемией внизу от пупочной раны
- г) отеком, гиперемией пупочного кольца, гнойным отделяемым из пупочной раны

Правильный ответ: г

ОРЗ и острые пневмонии у детей раннего возраста

17. Назовите из четырех один наиболее вероятный возбудитель бронхоолита

- а) стафилококк
- б) пневмококк
- в) респираторно-синцитиальный вирус
- г) ротавирус

Правильный ответ: в

18. Один из перечисленных препаратов наиболее эффективен для лечения микоплазменной пневмонии

- а) пенициллин
- б) эритромицин
- в) гентамицин
- г) линкомицин

Правильный ответ: б

19. Из названных четырех один является наиболее вероятным возбудителем стенозирующего ларинготрахеита

- а) шигелла
- б) сальмонелла

- в) вирус парагриппа
 - г) стафилококк
- Правильный ответ: в

Рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д

20. Для начального периода рахита характерны:

- а) мышечная гипертония
- б) краниотабес
- в) судорожный синдром
- г) облысение затылка

Правильный ответ: г

21. Для разгара рахита характерна следующая рентгенологическая картина:

- а) уплотнение зон роста
- б) нормальная оссификация костей
- в) расширение и размытость зон роста, блюдцеобразные эпифизы костей
- г) позднее появление ядер окостенения

Правильный ответ: в

22. Для периода разгара рахита не характерны:

- а) гипокальциурия
- б) гиперкальциурия
- в) гипокальциемия
- г) гипофосфатемия

Правильный ответ: а

Родовые травмы. Нейроинфекции

23. К эндогенным причинам задержки внутриутробного развития плода не относятся:

- а) соматическая патология беременной женщины
- б) плацентарная недостаточность
- в) внутриутробные инфекции
- г) генетическая патология

Правильный ответ: а

24. Новорожденный, родившийся в тяжелой гипоксии, имеет оценку по шкале Апгар:

а) 8-9 баллов

б) 5-7 баллов

а) 4-5 баллов

г) 3 балла и меньше

Правильный ответ: г

25. Для подтверждения диагноза внутримозгового кровоизлияния не следует проводить следующие исследования:

а) определять уровень сахара в крови

б) нейросонографию

в) люмбальную пункцию

г) исследовать глазное дно

Правильный ответ: а

Эндокринные заболевания

26. Назовите исследование, которое дает информацию о врожденной дисфункции коры надпочечников:

а) 17-оксипрогестерон,

б) исследование глазного дна,

в) определение холестерина в сыворотке крови,

г) диастаза мочи

Правильный ответ: а

27. Назовите лекарственное средство, применяемое при хронической надпочечниковой недостаточности:

а) преднизолон,

б) гипотиазид

в) липокаин

г) церукал

Правильный ответ: а

Заболевания крови

28. Симптом, характерный для тромбоцитопенической пурпуры:

а) боли в суставах,

б) увеличение лимфатических узлов,

в) петехии

г) пятнисто-папулезная сыпь

Правильный ответ: в

29. При тромбоцитопенической пурпуре изменяется:

- а) время свертывания,
- б) концентрация факторов свертывания крови,
- в) лейкоцитарная формула,
- г) количество мегакариоцитов

Правильный ответ: г

30. Тромбоцитопеническую пурпуру следует дифференцировать с:

- а) острым лейкозом,
- б) лимфогрануломатозом,
- в) инфекционным мононуклеозом.
- г) ревматизмом

Правильный ответ: а

Детские инфекции

31. Симптом, характерны для инфекционного мононуклеоза:

- а) синяки на коже,
- б) увеличение селезенки,
- в) воспаление легких.
- г) повышенная кровоточивость

Правильный ответ: б

32. Типичное изменение в анализе крови при инфекционном мононуклеозе:

- а) снижение тромбоцитов,
- б) снижение эритроцитов,
- в) нейтрофилез со сдвигом влево,
- г) атипичные мононуклеары

Правильный ответ: г

Заболевания органов пищеварения

33. Ребенок поступил на обследование по поводу рецидивирующих болей в животе. С учетом данных анамнеза и осмотра поставлен предварительный диагноз: обострение хронического гастродуоденита, холепатия. Какой из перечисленных методов может подтвердить гастродуоденит?

- а) общий анализ крови,
- б) биохимический анализ крови,
- в) фиброгастродуоденоскопия,
- г) копрология

Правильный ответ: в

34. Ребенок поступил в отделение с рецидивирующими болями в животе. При осмотре отмечается болезненность при пальпации в точке желчного пузыря, положительный симптом Ортнера.

Какие, в связи с этим, необходимо провести исследования для постановки диагноза:

- а) рентгенография грудной клетки,
- б) анализ мочи,
- в) УЗИ печени и желчного пузыря,
- г) копрология

Правильный ответ: в

Туберкулез

35. Назовите один из четырех предлагаемых сроков первой противотуберкулезной прививки

- а) 3-5 дней от роду
- б) 3-5 месяцев
- в) 3-5 лет
- г) 13-15 лет

Правильный ответ: а

36. Виражем туберкулиновых проб называют одну из предложенных ситуаций

- а) переход отрицательной туберкулиновой пробы в положительную
- б) переход положительной пробы в отрицательную
- в) нарастание размеров реакции на туберкулиновую пробу
- г) уменьшение размера реакции на пробу

Правильный ответ: а

Бронхиальная астма

37. Возможны следующие этиопатогенетические формы бронхиальной астмы, кроме одной:

- а) аспириновая
- б) гемолитическая
- в) от физического напряжения

г) пищевая

Правильный ответ: б

38. Клинические формы бронхиальной астмы могут быть следующие, кроме одной:

а) с типичными приступами

б) астматический бронхит

в) приступы спастического кашля

г) стенозирующий ларинготрахеит

Правильный ответ: г

Хроническая пневмония

39. Из перечисленных только один является морфологическим субстратом приобретенной первичной хронической пневмонии:

а) эмфизема легких

б) сегментарный (долевой) пневмосклероз

в) пневмоторакс

г) бронхоаденит

Правильный ответ: б

40. Из перечисленных только один не является необходимым методом исследования для диагностики хронической пневмонии:

а) анамнез

б) рентгенография грудной клетки

в) бронхография

г) кожные тесты

Правильный ответ: г

Заболевания почек

41. Укажите симптом, характерный для острого пиелонефрита:

а) повышение температуры тела,

б) отеки,

в) гипертония,

г) макрогематурия

Правильный ответ: а

42. Какой симптом из анамнеза свидетельствует в пользу хронического пиелонефрита:

- а) кашель,
- б) гематурия,
- в) отеки.
- г) рецидивирующая лейкоцитурия

Правильный ответ: г