

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)**

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ПО ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА**

Москва 2016

Тема 5
Кровотечения. Методы остановки кровотечений

ФИО _____

Вариант 1

1. Причинами кровотечения служат:

- 1) механическое повреждение стенки сосуда;
- 2) деструктивные изменения стенки сосуда;
- 3) гнойное расплавление сосуда;
- 4) ферментативное расплавление сосуда;
- 5) нарушения свертывания крови.

2. К общим признакам кровопотери относятся:

- 1) слабость;
- 2) головокружение;
- 3) бледные кожные покровы;
- 4) тахикардия;
- 5) рвота цвета «кофейной гущи».

3. Кровохаркание указывает на кровотечение из:

- 1) легких;
- 2) пищевода;
- 3) желудка;
- 4) двенадцатиперстной кишки;
- 5) носа.

4. Для лечения массивной кровопотери используют:

- 1) эритроцитную массу;
- 2) свежезамороженную плазму;
- 3) коллоидные плазмозаменители;
- 4) кристаллоидные плазмозаменители;
- 5) тромбоцитную массу.

5. К биологическим методам остановки кровотечения относятся: (два правильных ответа)

- 1) переливание изотонического раствора натрия хлорида;
- 2) переливание кровезаменителей;
- 3) переливание свежезамороженной плазмы;
- 4) применение гемостатической губки;
- 5) применение протеолитических ферментов.

Тема 5
Кровотечения. Методы остановки кровотечений

ФИО _____

Вариант 2

1. Защитно-приспособительные реакции организма на острую кровопотерю включают:

- 1) сужение сосудов;
- 2) расширение сосудов;
- 3) увеличение мочевыделения;
- 4) увеличение интенсивности сердечной деятельности;
- 5) привлечение в сосудистое русло межтканевой жидкости.

2. Для кровотечения характерно:

- 1) снижение АД;
- 2) повышение АД;
- 3) снижение уровня гемоглобина;
- 4) повышение уровня гемоглобина;
- 5) увеличение скорости мочевыделения.

3. Для диагностики желудочно-кишечного кровотечения используют:

- 1) эзофагогастродуоденоскопию;
- 2) колоноскопию;
- 3) УЗИ;
- 4) рентгенографию желудка;
- 5) анализ желудочного сока.

4. Что такое гематурия?

- 1) кровотечение из носа;
- 2) кровотечение из желудочно-кишечного тракта;
- 3) кровотечение из мочевых путей;
- 4) маточное кровотечение;
- 5) кровотечение из прямой кишки.

5. Давящую повязку накладывают при кровотечении из:

- 1) геморроидальных узлов;
- 2) вен голени;
- 3) подколенной артерии;
- 4) паренхиматозных органов.

Тема 5
Кровотечения. Методы остановки кровотечений

ФИО _____

Вариант 3

1. Укажите какие кровотечения относятся к внутренним:

- 1) в грудную полость;
- 2) в брюшную полость;
- 3) в просвет кишечника;
- 4) в межмышечное пространство;
- 5) в полость матки.

2. Дегтеобразный стул (мелена) указывает на кровотечение из:

- 1) желудка;
- 2) двенадцатиперстной кишки;
- 3) ободочной кишки;
- 4) прямой кишки;
- 5) селезенки.

3. Для диагностики кровотечения в плевральную полость используют:

- 1) рентгенографию грудной клетки;
- 2) бронхоскопию;
- 3) пункцию плевральной полости;
- 4) компьютерную томографию;
- 5) УЗИ.

4. Длительность наложения жгута на конечности в теплое время года:

- 1) до 30 минут;
- 2) до 1 часа;
- 3) до 2 часов;
- 4) до 3 часов;
- 5) до 6 часов.

5. Укажите механический способ окончательной остановки кровотечения:

- 1) применение фибриногена;
- 2) наложение артериального жгута;
- 3) наложение сосудистого шва;
- 4) применение гемостатической губки.

Тема 5
Кровотечения. Методы остановки кровотечений

ФИО _____

Вариант 4

1. Тяжесть состояния пациента с кровотечением зависит от:

- 1) объема кровопотери;
- 2) скорости кровопотери;
- 3) сопутствующих заболеваний сердца;
- 4) сопутствующих заболеваний костно-суставной системы;
- 5) нарушений в свертывающей системе .

2. Рвота цвета «кофейной гущи» указывает на кровотечение из:

- 1) желудка;
- 2) тощей кишки;
- 3) подвздошной кишки;
- 4) ободочной кишки;
- 5) прямой кишки.

3. Для диагностики внутрибрюшного кровотечения используют:

- 1) УЗИ;
- 2) лапароскопию;
- 3) гастроскопию;
- 4) колоноскопию;
- 5) обзорную рентгенографию брюшной полости.

4. Укажите способы временной остановки кровотечения:

- 1) давящая повязка;
- 2) максимальное сгибание конечности;
- 3) наложение жгута;
- 4) прошивание сосуда в ране;
- 5) наложение кровоостанавливающего зажима;
- 6) пальцевое прижатие артерии.

5. Для остановки кровотечения при гемофилии целесообразно применить: (один вариант ответа)

- 1) глюконат кальция;
- 2) криопреципитат;
- 3) переливание консервированной крови;
- 4) дицинон;
- 5) этамзилат натрия.

Тема 5
Кровотечения. Методы остановки кровотечений

ФИО _____

Вариант 5

1. Тяжесть состояния пациента с кровотечением оценивают на основании:

- 1) частоты сердечных сокращений;
- 2) уровня АД;
- 3) скорости мочевыделения;
- 4) уровня ЦВД;
- 5) уровня гемоглобина.

2. Стул с примесью свежей крови указывает на кровотечение из:

- 1) желудка;
- 2) двенадцатиперстной кишки;
- 3) ободочной кишки;
- 4) прямой кишки;
- 5) матки.

3. Для остановки кровотечения используют:

- 1) давящую повязку;
- 2) тампонаду раны;
- 3) пальцевое прижатие сосуда;
- 4) наложение жгута;
- 5) лигирование сосуда.

4. К механическим методам остановки кровотечения относятся:

- 1) перевязка сосуда в ране;
- 2) прошивание кровоточащего сосуда;
- 3) переливание компонентов крови;
- 4) применение гемостатической губки;
- 5) промывание раствором перекиси водорода.

5. Более адаптирован к кровопотере организм:

- 1) мужчин;
- 2) женщин;
- 3) детей;
- 4) пожилых.

Тема 5
Кровотечения. Методы остановки кровотечений

ФИО _____