

Жалобы на наличие с рождения на коже ярко-красного пятна

Укажите все правильные ответы

1. Ярко-красное пятно на коже ребенка с рождения наблюдается при
- а) абсцессе
 - б) гемангиоме
 - в) капиллярной дисплазии
 - г) фиброме
 - д) адипонекрозе
 - е) лимфангиоме
 - ж) синдроме Казабах-Меррит
 - з) беспигментном невусе

Укажите правильный ответ

2. Плоское, не возвышающееся над кожей, безболезненное, не увеличивающееся с ростом ребенка, красное пятно характерно для
- а) абсцесса
 - б) гемангиомы
 - в) капиллярной дисплазии
 - г) фибромы
 - д) адипонекроза
 - е) лимфангиомы
 - ж) синдрома Казабах-Меррит
 - з) беспигментного невуса



3. Красное, возвышающееся над кожей, безболезненное, растущее пятно, исчезающее при надавливании и вновь появляющееся характерно для
- а) абсцесса
 - б) гемангиомы
 - в) капиллярной дисплазии
 - г) фибромы
 - д) адипонекроза
 - е) лимфангиомы
 - ж) синдрома Казабах-Меррит
 - з) беспигментного невуса



4. Красное, возвышающееся над кожей пятно, с мягким синюшным конгломератом в подкожной клетчатке безболезненное, растущее характерно для

- а) абсцесса
- б) гемангиомы комбинированной
- в) капиллярной дисплазии
- г) фибромы
- д) адипонекроза
- е) лимфангиомы
- ж) синдрома Казабах-Меррит
- з) беспигментного невуса



5. Красно-синюшное, плотное, безболезненное, возвышающееся над кожей пятно, с множественными петехиальными кровоизлияниями по периферии, кровоточивостью слизистых, характерно для

- а) абсцесса
- б) гемангиомы комбинированной
- в) капиллярной дисплазии
- г) фибромы
- д) адипонекроза
- е) лимфангиомы
- ж) синдрома Казабах-Меррит
- з) беспигментного невуса



6. Для подтверждения диагноза синдрома Казабах-Меррит показано лабораторное обследование

- а) проба Абелева-Татарина
- б) время свертывания крови
- в) количество тромбоцитов
- г) лейкоцитоз
- д) СОЭ
- е) коагулограмма

Укажите все правильные ответы

7. Срочная консультация в криоцентре необходима детям в случаях

- а) быстрого роста гемангиомы
- б) локализации на лице
- в) больших размерах гемангиомы
- г) капиллярной дисплазии
- д) синдроме Казабах-Меррит
- е) у всех недоношенных детей
- ж) в стадии регрессии

Укажите правильный ответ

8. Капиллярная дисплазия требует лечения

- а) УВЧ
- б) криодеструкции
- в) электрокоагуляции
- г) эмболизации
- д) наблюдения
- е) склерозирования
- ж) гормонотерапии
- з) короткофокусная рентгенотерапии
- и) хирургического удаления

9. Простая гемангиома требует экстренного лечения в случае

- а) роста вместе с ребенком
- б) быстрого роста
- в) стадии регрессии
- г) изъязвления

10. Простая быстро растущая гемангиома кожи требует лечения

- а) УВЧ
- б) криодеструкции
- в) СВЧ –гипертермия
- г) эмболизации

- д) наблюдения
- е) склерозирования
- ж) гормонотерапии
- з) короткофокусная рентгенотерапии
- и) хирургического удаления

Укажите все правильные ответы

11. Кавернозная, комбинированная, быстро растущая гемангиома может потребовать лечения

- а) УВЧ
- б) криодеструкции
- в) СВЧ-гипертермия
- г) эмболизации
- д) наблюдения
- е) склерозирования
- ж) гормонотерапии
- з) короткофокусная рентгенотерапии
- и) хирургического удаления

12. Гемангиома при синдроме Казабах-Меррит требует лечения

- а) УВЧ
- б) криодеструкции
- в) СВЧ-гипертермия
- г) эмболизации
- д) наблюдения
- е) склерозирования
- ж) гормонотерапии
- з) короткофокусная рентгенотерапии
- и) хирургического удаления

Ответы:

1 б, в, ж. 2 в 3 б 4 б 5 ж. 6 в 7 а, б, в, д. 8 д 9 б. 10 б

11 б, в, г, е, ж, з, и 12 ж, з

