

Жалобы на боли в животе, возникшие 6 часов назад, однократную рвоту.

1. Остро возникшие боли в животе с однократной рвотой характерны для:

- а) острого аппендицита
- б) копростаз
- в) почечной колики
- г) печеночной колики
- д) болезни Крона
- е) криптогенного перитонита
- ж) мезаденита

Ответ: а, в, г, е, ж.

2. Остро возникшие боли в животе с однократной рвотой, температурой характерны для:

- а) острого аппендицита
- б) копростаза
- в) почечной колики
- г) печеночной колики
- д) болезни Крона
- е) криптогенного перитонита
- ж) мезаденита

Ответ а, е, ж.

3. При болях в животе показано клиническое обследование с определением

- а) зоны локальной болезненности
- б) мышечной защиты
- в) симптома Щеткина-Блюмберга
- г) симптома Пастернацкого
- д) симптома Ортнера

- е) пустоты правой подвздошной ямки
- ж) исчезновения печеночной тупости
- з) осмотр per rectum
- и) термометрия

Ответ а, б, в, г, д, з, и.

4. Локальная болезненность в правой подвздошной области, пассивная мышечная защита, положительный симптом Щеткина –Блюмберга, температура - характерны для

- а) острого аппендицита
- б) копростаза
- в) почечной колики
- г) печеночной колики
- д) пневмонии
- е) криптогенного перитонита
- ж) мезаденита

Ответ а, е.

5. Локальная болезненность в правой подвздошной области, активная мышечная защита, отрицательный симптом Щеткина –Блюмберга, катаральные явления, температура - характерны для

- а) острого аппендицита
- б) копростаза
- в) почечной колики
- г) печеночной колики
- д) болезни Крона
- е) криптогенного перитонита
- ж) мезаденита

Ответ ж.

6. Локальная болезненность в правой подвздошной области, активная мышечная защита, отрицательный симптом Щеткина –Блюмберга - характерны для

- а) острого аппендицита
- б) копростаза
- в) почечной колики
- г) печеночной колики
- д) мезаденита
- е) криптогенного перитонита

Ответ б, в, г, д.

7. Выявление при осмотре per rectum болезненного образования в правом отделе Дугласова пространства характерно для

- а) острого аппендицита
- б) пневмонии
- в) почечной колики
- г) копростаза
- д) болезни Крона
- е) криптогенного перитонита
- ж) мезаденита

Ответ а.

8. Для экспресс диагностики острого живота показано лабораторное исследование

- а) общий анализ крови
- б) общий анализ мочи
- в) биохимический анализ крови
- г) ревматические пробы
- д) биохимический анализ мочи
- е) лейкоцитоз

Ответ е.

9. Для ребенка с неосложненным острым аппендицитом характерны следующие изменения количества лейкоцитов:

- а) высокий, свыше 20тыс.
- б) умеренный до 20 тыс.
- в) лейкопения
- г) норма

Ответ: б.

10. Для ребенка с криптогенным пельвиоперитонитом характерны следующие изменения количества лейкоцитов:

- а) высокий, свыше 20тыс.
- б) умеренный до 20 тыс.
- в) лейкопения
- г) норма

Ответ: а.

11. Отсутствие изменений со стороны лейкоцитов периферической крови характерно для

- а) острого аппендицита
- б) копростаза
- в) почечной колики
- г) печеночной колики
- д) криптогенного перитонита
- е) пневмонии
- ж) мезаденита

Ответ б, в, г.

12. При остро возникших болях в животе необходимо инструментальное исследование

- а) пневмоиригография
- б) ультразвуковое исследование
- в) обзорная рентгенография брюшной полости
- г) колоноскопия
- д) радиоизотопное исследование

Ответ: б.

13. Ребенку с остро возникшими болями в животе показано

- а) амбулаторное обследование
- б) госпитализацию в педиатрическое отделение
- в) плановую госпитализацию в хирургическое отделение
- г) экстренную госпитализацию в хирургическое отделение
- д) госпитализацию в инфекционное отделение

Ответ: г

14. Экстренное оперативное вмешательство показано при

- а) остром аппендиците
- б) копростазе
- в) почечной колике
- г) печеночной колике
- д) криптогенном перитоните
- е) пневмонии
- ж) мезадените

Ответ а, д.