

Жалобы на боли в животе в течение 8 часов у девочки 5 лет.

Укажите все правильные ответы

1. Боли в животе характерны для:

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростазы
- д) почечной колики
- е) пневмонии

2. Жалобы на: тянущие, ноющие боли в правых отделах живота, однократную рвоту, субфебрильную температуру -могут быть при:

- а) острым аппендиците
- б) дивертикулите Меккеля
- в) пельвиоперитоните
- г) копростазе
- д) почечной колике
- е) пневмонии

3. Жалобы на: тянущие, ноющие боли в животе, однократную рвоту, гипертермию (выше 38,5°) - могут быть при :

- а) острым аппендиците
- б) дивертикулите Меккеля
- в) пельвиоперитоните
- г) копростазе
- д) почечной колике
- е) пневмонии

4. Жалобы на схваткообразные боли в животе при нормальной температуре могут быть при:

- а) острым аппендиците
- б) дивертикулите Меккеля
- в) пельвиоперитоните

- г) копростазе
- д) почечной колике
- е) пневмонии

5. При пальпации живота : локальная болезненность в правой подвздошной области, пассивная мышечная защита, положительный симптом Щеткина – Блюмберга, - характерны для:

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаза
- д) почечной колики
- е) пневмонии

6. При пальпации живота: локальная болезненность в правой половине, активная мышечная защита, отрицательный симптом Щеткина –Блюмберга, - характерны для:

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаза
- д) почечной колики
- е) пневмонии

Укажите правильный ответ

7. При пальпации живота: болезненность в левой половине живота области, активная мышечная защита, отрицательный симптом Щеткина –Блюмберга - характерны для

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаза
- д) почечной колики

е) пневмонии

8. Выявление при осмотре промежности гиперемии тканей преддверия влагалища, наличие слизисто-гноевидных выделений характерно для:

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаз
- д) почечной колики
- е) пневмонии

Укажите все правильные ответы

9. Выявление при осмотре per rectum болезненности в правом отделе Дугласова пространства характерно для

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаз
- д) почечной колики
- е) пневмонии

Укажите правильный ответ

10. Для экспресс диагностики этиологии болей в животе показано лабораторное исследование:

- а) общий анализ крови
- б) общий анализ мочи
- в) лейкоцитоз
- г) КЩС, Ht, Hb
- д) группа крови, Rh-фактор

Укажите все правильные ответы

11. Если показатели лейкоцитов в анализе крови 10-15 тыс. – можно думать о:

- а) остром аппендиците
- б) дивертикулите Меккеля
- в) пельвиоперитоните
- г) копростазе
- д) почечной колике
- е) пневмонии

12. Если показатели лейкоцитов в анализе крови более 20 тыс. – можно думать о:

- а) остром аппендиците
- б) дивертикулите Меккеля
- в) пельвиоперитоните
- г) копростазе
- д) почечной колике
- е) пневмонии

13. Если показатели лейкоцитов в анализе крови 5-7тыс. – можно думать о:

- а) остром аппендиците
- б) дивертикулите Меккеля
- в) пельвиоперитоните
- г) копростазе
- д) почечной колике
- е) пневмонии

Укажите правильный ответ

14. Для уточнения диагноза ребенку с болями в животе показано экстренное инструментальное исследование:

- а) УЗИ органов брюшной полости
- б) обзорная рентгенография брюшной полости

- в) рентгеноконтрастное исследование кишечника
- г) колоноскопия
- д) радиоизотопное исследование

15. При УЗИ определяется червеобразный отросток размерами 9мм с гипоехогенными стенками, в просвете взвесь. Рядом визуализируется отенный салъгник размерами 4х3см, увеличенные мезентериальные лимфоузлы, что характерно для

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаз
- д) почечной колики
- е) пневмонии

16. При УЗИ в полости малого таза определяется до 30 мл жидкости, маточные трубы отечные, стенки гипоехогенные. Червеобразный отросток диаметром 3 мм в диаметре, не изменен. Это характерно для ...

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаз
- д) почечной колики
- е) пневмонии

17. При УЗИ в проекции мезогастрия определяется опухолевидное образование размерами 3х4см с отечными стенками, идентичными стенками кишки, не перистальтирующее. В просвете имеется густое содержимое. Что характерно для...

- а) острого аппендицита
- б) дивертикулита Меккеля
- в) пельвиоперитонита
- г) копростаз

- д) почечной колики
- е) пневмонии

Укажите все правильные ответы

18. Экстренное оперативное вмешательство показано у ребенка с

- а) острым аппендицитом
- б) дивертикулитом Меккеля
- в) пельвиоперитонитом
- г) копростазом
- д) почечной коликой
- е) пневмонией

Укажите правильный ответ

19. Экстренная рентгенография грудной клетки показана у ребенка с

- а) острым аппендицитом
- б) дивертикулитом Меккеля
- в) пельвиоперитонитом
- г) копростазом
- д) почечной коликой
- е) пневмонией

20. Очистительная клизма показана у ребенка с

- а) острым аппендицитом
- б) дивертикулитом Меккеля
- в) пельвиоперитонитом
- г) копростазом
- д) почечной коликой
- е) пневмонией

Укажите все правильные ответы

21. Дальнейшее обследование показано у ребенка с

- а) острым аппендицитом
- б) дивертикулитом Меккеля
- в) пельвиоперитонитом

г) копростазом

д) почечной коликой

е) пневмонией

Ответы:

1. а,б, в, г, д, е. **2.** а,б. **3.** в,е. **4.** г,д. **5.** а,б, в. **6.** д,е. **7.** г. **8.** в. **9.** а,в. **10.** в.

11. а,б. **12.** в,е **13.** г,д. **14.** а. **15.** а. **16.** в. **17.** б. **18.** а,б,в. **19.** е. **20.** г.

21. г,д,е.