

**Жалобы на учащенное мочеиспускание малыми порциями у ребенка 5 лет.**

Укажите все правильные ответы

**1. Учащенное мочеиспускание малыми порциями характерно для:**

- а) гиперактивного мочевого пузыря
- б) гипорекфлекторного мочевого пузыря
- в) гидронефроза
- г) инфекции мочевых путей
- д) цистита

Укажите правильный ответ

**2. Учащенное безболезненное малыми порциями мочеиспускание характерно для**

- а) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
- б) гипорекфлекторного мочевого пузыря
- в) гидронефроза
- г) инфекции мочевых путей
- д) цистита

Укажите все правильные ответы

**3. Учащенное болезненное малыми порциями мочеиспускание, гипертермия характерно для**

- а) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
- б) гипорекфлекторного мочевого пузыря
- в) гидронефроза
- г) инфекции мочевых путей
- д) цистита

Укажите правильный ответ

**4. Редкие мочеиспускания, большим объемом, частичное недержание мочи характерно для**

- а) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря

- б) гипорекфлекторного мочевого пузыря
- в) гидронефроза
- г) инфекции мочевых путей
- д) цистита

Укажите все правильные ответы

**5.** При жалобах на частое мочеиспускание малыми порциями необходимо провести обследование:

- а) суточный ритм спонтанных мочеиспусканий
- б) клинический анализ мочи
- в) УЗИ с наполненным и опорожненным мочевым пузырем с измерением остаточной мочи.
- г) экскреторную урографию
- д) компьютерная томография органов малого таза
- е) рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника
- ж) цистоуретрографию

Укажите правильный ответ

**6.** При обследовании для неосложненного гиперактивного мочевого пузыря характерно:

- а) учащенное мочеиспускание малыми порциями
- б) лейкоцитурия
- в) расширение коллекторной системы почек

Укажите все правильные ответы

**7.** При осложненном гиперактивном мочевом пузыре характерно:

- а) учащенное мочеиспускание малыми порциями
- б) лейкоцитурия
- в) расширение коллекторной системы почек

Укажите правильный ответ

**8.** При УЗИ для неосложненного гиперактивного мочевого пузыря характерно

- а) расширение коллекторной системы почек

- б) утолщении стенок коллекторной системы почек
- в) норма

Укажите все правильные ответы

**9.** При УЗИ для осложненного гиперактивного мочевого пузыря характерно

- а) расширение коллекторной системы почек
- б) утолщении стенок коллекторной системы почек
- в) норма
- г) утолщение стенок мочевого пузыря

Укажите правильный ответ

**10.** Для гиперактивного мочевого пузыря при рентгенографии пояснично-крестцового отдела позвоночника характерно

- а) spina bifida occulta
- б) сколиоз
- в) лордоз

**11.** При цистоуретрографии для неосложненного гиперактивного мочевого пузыря характерно

- а) пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- б) расширение задней уретры
- в) уменьшение емкости мочевого пузыря
- г) нормальная емкость мочевого пузыря

Укажите все правильные ответы

**12.** На цистоуретрографии для осложненного гиперактивного мочевого пузыря характерно

- а) пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- б) расширение задней уретры
- в) уменьшение емкости мочевого пузыря
- г) нормальная емкость мочевого пузыря

**13.** При выявлении гиперактивного мочевого пузыря необходимо лечение:

- а) оперативное
- б) физиолечение, тепловые процедуры

в) фармакотерапия.

**Ответы:**

**1.** а, г, д. **2** а. **3** г, д. **4** б. **5** а б в, е, ж. **6** а. **7** а, б, в. **8** в. **9** а.б.г. **10** а  
**11** в. **12** а, в. **13** б, в.