

**С рождения отмечено искривление полового члена, смещение наружного отверстия уретры, расщепление листков крайней плоти, разбрызгивающая струйка мочи.**

Укажите все правильные ответы

**1.** Смещение меатального отверстия, расщепление крайней плоти, искривление полового члена характерно для:

- а) гипоспадии
- б) рубцового фимоза
- в) парафимоза
- г) эписпадии

Укажите правильный ответ

**2.** Меатальное отверстие смещено по вентральной поверхности, крайняя плоть полового члена расщеплена, что характерно для:

- а) гипоспадии
- б) рубцового фимоза
- в) экстрофии мочевого пузыря
- г) эписпадии
- д) парафимоза

**3.** Меатальное отверстие расщепленной уретры смещено по дорзальной поверхности искривленного полового члена, что характерно для:

- а) гипоспадии
- б) рубцового фимоза
- в) парафимоза
- г) эписпадии

**4.** Расположение меатального отверстия в области венечной борозды характерно для:

- а) гипоспадии типа хорды
- б) венечной формы гипоспадии
- в) дистально-стволовой формы гипоспадии

г) экстрофии

д) эписпадии



**5.** Дистопия меатального отверстия в верхней трети ствола полового члена, деформация полового члена и расщепление крайней плоти по вентральной поверхности характерно для:

- а) гипоспадии типа хорды
- б) венечной формы гипоспадии
- в) дистально-стволовой формы гипоспадии
- г) экстрофии мочевого пузыря
- д) эписпадии




**6.** Дистопия меатального отверстия в нижней трети ствола полового члена, деформация полового члена и расщепление крайней плоти по вентральной поверхности характерно для:

- а) гипоспадии без гипоспадии
- б) венечной формы гипоспадии
- в) дистально-стволовой формы гипоспадии
- г) проксимально-стволовой формы гипоспадии
- д) эписпадии



7. Дистопия меатального отверстия уретры в область мошонки, выраженная деформация полового члена, расщепление крайней плоти по вентральной поверхности, расщепление мошонки и мочеиспускание по женскому типу характерно для:

- а) мошоночной гипоспадии
- б) венечной формы гипоспадии
- в) дистально-стволовой формы гипоспадии
- г) проксимально-стволовой формы гипоспадии
- д) эписпадии



8. Расщепление уретры и кавернозных тел по дорзальной поверхности, недоразвитие полового члена, имеющего вид крючка подтянутого кверху, тотальное недержание мочи характерно для

- а) мошоночной гипоспадии
- б) урогенитальный синус
- в) ложный мужской гермофрадитизм
- г) эписпадия тотальная
- д) экстрофии мочевого пузыря

9. Расщепление уретры и кавернозных тел по дорзальной поверхности, недоразвитие полового члена, имеющего вид крючка подтянутого кверху,

расщепление передней стенки мочевого пузыря, тотальное недержание мочи характерно для

- а) мошоночной гипоспадии (задняя форма)
- б) урогенитальный синус
- в) ложный мужской гермофрадитизм
- г) эписпадия тотальная
- д) экстрофии мочевого пузыря



**10.** Ребенку с дистально-стволовой формой гипоспадии показано комплексное обследование в возрасте

- а) после 1 месяца
- б) после 1 года
- в) после 3 лет
- г) после 5 лет

Укажите все правильные ответы

**11.** Комплексное клинико-инструментальное обследования при передних формах гипоспадии включает:

- а) осмотр и пальпация половых органов, паховых областей
- б) УЗИ мочевых путей, простаты
- в) консультацию эндокринолога
- г) консультацию генетика
- д) калибровку отверстия уретры

**12.** Комплексное клинико-инструментальное обследования при задних формах гипоспадии включает:

- а) осмотр и пальпация половых органов, паховых областей

- б) УЗИ мочевых путей, простаты
- в) консультация эндокринолога
- г) консультация генетика
- д) цистография
- е) калибровку отверстия уретры

Укажите правильный ответ

**13.** При выявлении меатального стеноза у ребенка грудного возраста показано

- а) наблюдение до 1 года
- б) оперативное лечение – меатотомия в ближайшие сроки

**14.**Сроки оперативного лечения детей с гипоспадией:

- а) до 3 месяцев жизни
- б) 12-14 лет
- в) 5-7 лет
- г) 1-2 года.

**1 а, г. 2 а. 3.г. 4 б. 5 в. 6 г 7 а. 8 г. 9 д. 10 б. 11 а, б, д. 12 а, б, в, г, д. 13 б.**

**14. г.**

