

Жалобы на внезапно возникшее приступообразное беспокойство, однократную рвоту пищей, отсутствие стула в течение суток у ребенка 8 месяцев.

1. Острое приступообразное начало заболевания с рвотой и задержкой стула характерно для:
- а) Пареза кишечника
 - б) Инвагинации кишечника
 - в) Болезни Гиршпрунга
 - г) Копростаза
 - д) Острого кишечного отравления
 - е) Ущемленной паховой грыжи

Ответ: б,е

2. Отсутствие стула является основным симптомом:
- а) пареза кишечника
 - б) инвагинации кишечника
 - в) болезни Гиршпрунга
 - г) копростаза
 - д) пищевой токсикоинфекции

Ответ: а, б, в, г.

3. Остро возникшее, не купирующееся приступообразное беспокойство у соматически здорового грудного ребенка является основным симптомом
- а) инвагинации
 - б) болезни Гиршпрунга
 - в) пареза кишечника
 - г) панкреатита

Ответ а.

4. При подозрении на инвагинацию кишечника необходимо провести клиническое обследование:
- а) Пальпацию живота
 - б) Перкуссию живота
 - в) Аускультацию перистальтики кишечника
 - г) Пальцевое ректальное исследование

Ответ: а, в, г.

5. Инвагинация кишечника клинически подтверждается, если при пальпации живота определяется:
- а) Наличие по ходу кишки «колбасовидного» образования
 - б) Симптом запустевания правой подвздошной области (с-м Данса)
 - в) Пассивное мышечное напряжение в правой подвздошной области
 - г) Симптом «песочных часов»

д) Симптом “исчезновения печеночной тупости”.

Ответ: а, б

6. Выявление алой крови со слизью при ректальном пальцевом обследовании подтверждает диагноз

- а) пареза кишечника
- б) болезни Гиршпрунга
- в) инвагинации
- г) кишечной инфекции

Ответ в.

7. Инструментальные исследования при подозрении на инвагинацию назначаются:

- а) Экстренно при поступлении в стационар
- б) После проведения подготовки
- в) В плановом порядке

Ответ: а

8. Диагноз инвагинации кишечника можно подтвердить при помощи:

- а) УЗИ
- б) Обзорной рентгенографии брюшной полости
- в) Пневмоирригографии
- г) Исследование пассажа контраста по ЖКТ
- д) Фиброколоноскопии.

Ответ: а, в.

9. Рентгенологическими признаками инвагинации кишечника являются

- а) Симптом «округлой тени»
- б) Симптом «серпа»
- в) Чаши Клойбера
- г) Кишечные арки
- д) Свободное прохождение воздуха в тонкую кишку



Ответ: а,б.

10. При подозрении на инвагинацию участковый педиатр назначает

- а) Амбулаторное обследование
- б) Диету и медикаментозное лечение
- в) Лечебно-диагностическую пневмоирригографию
- г) Экстренную госпитализацию в хирургический стационар

Ответ: г

11. Методом выбора в лечении инвагинации кишечника в ранние сроки заболевания является:

- а) Лапароскопия
- б) Колоноскопия
- в) Пневмоирригоскопия
- г) Интраоперационная дезинвагинация «методом выдаивания»

Ответ в.