

Жалобы на отсутствие яичка в мошонке с рождения.

Укажите все правильные ответы

1. Отсутствие яичка в мошонке является основным признаком

- а) крипторхизм
- б) эктопия яичка
- в) ложный крипторхизм
- г) паховая грыжа
- д) водянка оболочек яичка
- е) монорхизм



Укажите правильный ответ

2. При отсутствии яичка в недоразвитой мошонке и выявлении пальпаторно округлого, малоподвижного, б/болезненного образования в паховом канале можно думать о

- а) крипторхизме, паховой форме
- б) варикоцеле
- в) перекруте яичка
- г) монорхизме
- д) ложном крипторхизме



3. При отсутствии яичка в мошонке и выявлении пальпаторно округлого, подвижного, б/болезненного образования в области промежности можно думать о

- а) крипторхизм, паховая форма
- б) паховая эктопия яичка
- в) промежностная эктопия яичка.
- г) перекрут яичка
- д) монорхизме

е) ложный крипторхизм



Укажите все правильные ответы

4. При отсутствии яичка в недоразвитой мошонке и паховом канале можно думать о

- а) крипторхизм, паховая форма
- б) анорхизме
- в) абдоминальном крипторхизме
- г) перекрут яичка
- д) монорхизме
- е) ложный крипторхизм

5. У ребенка 1-3 месяцев с односторонним паховым крипторхизмом показано обследование

- а) осмотр и пальпация органов мошонки и паховых областей
- б) УЗИ мошонки, паховых каналов.
- в) УЗИ брюшной полости.
- г) диагностическая лапароскопия
- д) консультация эндокринолога
- е) диафаноскопия

6. Консультация генетика, эндокринолога, исследование гормонального профиля при патологии яичек показаны у детей с

- а) односторонним крипторхизмом
- б) ложным крипторхизмом
- в) двусторонним абдоминальным крипторхизмом
- г) анорхизмом
- д) монорхизмом
- е) эктопией яичка

Укажите правильный ответ

7. Исследования гормонального профиля позволяют дифференцировать двусторонний абдоминальный крипторхизм и анорхизм в возрасте

- а) до 6 месяцев

- б) с 6 до 12 месяцев
- в) после года

Укажите все правильные ответы

8. При абдоминальном крипторхизме, монорхизме, анорхизме необходимо обследование:

- а) осмотр и пальпация органов мошонки и паховых областей
- б) УЗИ мошонки, паховых каналов.
- в) УЗИ брюшной полости.
- г) диагностическая лапароскопия
- д) консультация эндокринолога.
- е) консультация генетика,
- ж) определение полового кариотипа

Укажите правильный ответ

9. Тактика лечения недоношенного ребенка с односторонним крипторхизмом на первом году жизни

- а) наблюдение
- б) гормональное лечение
- в) оперативное лечение

10. Тактика лечения ребенка с двусторонним паховым крипторхизмом на первом году жизни:

- а) курс гормональной терапии
- б) наблюдение
- в) оперативное лечение низведение яичек.

11. Тактика ведения ребенка с абдоминальным, двусторонним крипторхизмом (анорхизмом) в возрасте от 1 до 2 лет жизни:

- а) диагностическая лапароскопия – оценка положения и состояния яичек
- б) курс гормональной терапии
- в) наблюдение
- г) низведение яичек

12. Диагностическая лапароскопия при абдоминальном крипторхизме с оценкой положения и состояния яичек выполняется в возрасте

- а) после 1 месяца
- б) после 6 месяцев
- в) после 1 года
- г) после 2 лет.

- 13.** Оперативное низведения яичка при крипторхизме показано в возрасте:
- а) 3-6 месяцев
 - б) 1,5 -2 года
 - в) 4-5 лет
 - г) 7-8 лет.

Ответы:

1 а, б, в, е **2** а. **3** в. **4** в, д. **5** а, б. **6** в, г. **7** а. **8** а, б, в, г, д, е, ж. **9** а. **10** б. **11** а.
12 в. **13** б