

Жалобы на обнаружение опухолевидного, безболезненного образования в области кивательной мышцы с наклоном головы у ребенка 3-х недель жизни.

Укажите номера правильных ответов:

1. Опухолевидное образование в области шеи с наклоном головы в 3 - недельном возрасте является симптомом

- а) мышечной кривошеи
- б) дермоидной кисты шеи
- в) нейрогенной кривошеи
- г) опухолевидного образования
- д) остеогенной кривошеи
- е) болезни Гризеля
- ж) рахита

Укажите номер правильного ответа:

2. Веретенообразное, безболезненное утолщение средней трети кивательной мышцы с фиксированным наклоном головы на эту же сторону характерно для

- а) мышечной кривошеи
- б) дермоидной кисты шеи
- в) нейрогенной кривошеи
- г) опухолевидного образования
- д) остеогенной кривошеи
- е) болезни Гризеля
- ж) рахита

Укажите номера правильных ответов:

3. Наличие безболезненного образования в проекции кивательной мышцы без фиксированного наклона головы характерно для

- а) мышечной кривошеи
- б) дермоидной кисты шеи
- в) нейрогенной кривошеи
- г) опухолевидного образования
- д) остеогенной кривошеи
- е) болезни Гризеля
- ж) рахита

4. Фиксированный наклон головы без объемного образования кивательной мышцы характерен для

- а) мышечной кривошеи
- б) дермоидной кисты шеи

- в) рахита
- г) опухолевидного образования
- д) остеогенной кривошеи
- е) болезни Гризеля

5. При подозрении на кривошею необходимо провести клиническое обследование:

- а) осмотр положения головы ребенка
- б) пальпацию кивательных мышц с обеих сторон
- в) осмотр и оценка формы черепа
- г) пальпацию структур шеи
- д) проверить объем движений

Укажите номер правильного ответа:

6. При выявлении в области кивательной мышцы образования, сопровождающегося фиксированным наклоном головы необходимо выполнить:

- а) УЗИ кивательных мышц
- б) рентгенографию шейного отдела позвоночника
- в) МРТ
- г) КТ

Укажите номера правильных ответов:

7. Фиксированный наклон головы при исключении мышечной кривошеи является показанием к выполнению

- а) рентгенографию шейного отдела позвоночника
- б) МРТ
- в) КТ

8. У ребенка 1 месяца жизни с мышечной кривошеей необходимо провести лечение:

- а) массаж, ЛФК
- б) оперативное лечение
- в) физиотерапию

9. Остеогенная кривошея требует лечения

- а) наблюдения ортопеда
- б) наблюдения невропатолога
- в) экстренной операции

Укажите номер правильного ответа:

10. Солидные образования в области кивательной мышцы, вызывающие кривошею требуют лечения

- а) консультацию онколога
- б) наблюдения
- в) массажа
- г) физиотерапии

Ответы:

1. а,б, г . **2** а. **3.** б, г. **4.** а, д,е. **5.** а, б, в, г, д. **6.** а. **7.** а,в. **8.** а,в. **9.** а, б. **10.** а