

**Жалобы на появление в теменной области мягкотканого образования после падения ребенка 6 месяцев, с высоты метра на пол, за 8 часов до осмотра.**

Укажите правильный ответ

1. Появление мягкотканого образования в теменной области вскоре после падения ребенка указывает на:

- а) перелом теменной кости
- б) гемангиому
- в) лимфангиому
- г) кефалогематому

Укажите все правильные ответы

2. Изменения в поведении ребенка: нарушения сна, рвота, наряду с припухлостью в теменной области вскоре после травмы наблюдаются при

- а) сотрясении мозга
- б) ушибе мозга
- в) внутричерепной гематоме
- г) отеке мозга

3. Ребенок первого года жизни с экстракраниальной гематомой, требует клинического обследования на догоспитальном этапе

- а) осмотр зоны повреждения
- б) определение АД, частоту пульса и дыхания
- в) проверки на наличие патологических рефлексов
- г) оценки реакции зрачков
- д) исключение кровотечения из уха и носоглотки
- е) проверки рефлексов по черепно-мозговым нервам

4. Кратковременная потеря сознания, отказ от еды, повторная рвота, сонливость, незначительное сужение зрачков с хорошей реакцией на свет, мелкокоразмашистый нистагм – клинические проявления

- а) сотрясения мозга
- б) ушиба мозга
- в) внутричерепной гематомы
- г) отека мозга

Укажите правильный ответ


5. При подозрении на перелом теменной кости у ребенка показано проведение

- а) термографии

- б) ЭЭГ
- в) рентгенографии
- г) ЭХО-ЭГ

6. Выявление на обзорной рентгенограмме черепа трещины теменной кости характерно для

- а) перелома по типу "целлулоидного мячика"
- б) линейного перелома свода черепа
- в) перелома основания черепа



7. Выявление на обзорной рентгенограмме черепа прогибания внутрь участка теменной кости характерно для

- а) перелома по типу "целлулоидного мячика"
- б) линейного перелома черепа
- в) перелома основания черепа



Укажите все правильные ответы

8. Нарастание неврологической симптоматики, появление локальных и патологических симптомов у ребенка с внутричерепной травмой требует обследования

- а) ЭХО-ЭГ
- б) ЭЭГ
- в) КТ или МРТ

Укажите правильный ответ

9. Ребенок с подозрением на перелом теменной кости нуждается
- а) в амбулаторном лечении
  - б) стационарном лечении
  - в) амбулаторном наблюдении невропатолога

**Ответы**

**1 а. 2 а, б, в, г. 3 а, б, в, г, е. 4 а, б, в. 5 в. 6 б. 7 а. 8 а, в. 9 б**