

Часто болеющему ОРВИ и пневмонией ребенку 2 лет была выполнена рентгенограмма грудной клетки

Укажите все правильные ответы

1. В левой половине грудной клетки определяется перкуторно коробочный звук, дыхание резко ослаблено. Сердечные тоны определяются за грудиной, что характерно для

- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

Укажите правильный ответ

2. На обзорном снимке В левой половине грудной клетки определяется образование больших размеров, овальной формы, с повышенной прозрачностью, без легочного рисунка, с тонким контуром, с уплотнением легочной ткани по периферии, средостение смещено вправо что характерно для:



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

3. На обзорном снимке слева отмечается повышенная воздушность легочной ткани, легочный рисунок сохранен. Внизу у корня видна треугольная тень. Средостение смещено вправо, что характерно для:



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

4. На обзорной рентгенограмме грудной полости слева видны множественные воздушные полости с тонкими контурами без легочного рисунка. Средостение смещено вправо что характерно для:



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

5. На обзорном снимке в левой плевральной полости отмечено образование с уровнем жидкости и дополнительные ячеистые образования. Средостение смещено вправо, что характерно для:



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

Укажите все правильные ответы

6. В левой половине грудной клетки определяется перкуторно притупление легочного звука, дыхание резко ослаблено. Сердечные тоны определяются за грудиной, что характерно для

- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

Укажите правильный ответ

7. В левой половине грудной клетки определяется однородное затемнение больших размеров, овальной формы, с четкими контурами что характерно для



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

8. На обзорном снимке в нижних отделах левой половине грудной клетки определяется однородное затемнение с четкими контурами что характерно для



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

Укажите все правильные ответы

9. При выявлении клинико-рентгенологической патологии в грудной полости показаны инструментальные исследования:

- а) ангиография
- б) КТ органов грудной полости

- в) Бронхоскопия
- г) Радиоизотопное исследование
- д) ФЭГДС


Укажите правильный ответ

10. На КТ с в/в контрастированием в 3D реконструкции определяется аномальный сосуд к нижним отделам левого легкого от нисходящей аорты.



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долеой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения


11. На КТ определяются множественные кисты левого легкого, заполненные воздухом, явления внутригрудного напряжения что характерно для :



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долеой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого


- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

12. При радиоизотопном исследовании легких выявлено резкое снижение накопления радиофармпрепарата в проекции верхней доли правого легкого.



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевого эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

13. На КТ отмечается тень дополнительного образования занимающая всю левую плевральную полость. Паренхима левого легкого не визуализируется. Средостение смещено вправо



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевого эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

14. На КТ в левой плевральной полости отмечается округлое образование с четкими контурами заполненное воздухом. Средостение резко смещено вправо.



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

15 На КТ в левой плевральной полости отмечаются дополнительные неоднородные тени, заполненные воздухом/жидкостью. Тень диафрагмы слева не визуализируется. В брюшной полости снижено газонаполнение кишечника. Отсутствует газовый пузырь желудка в брюшной полости.



- а) ателектаза легкого
- б) напряженной кисты легкого
- в) легочной секвестрации
- г) бронхоэктазии
- д) врожденной долевой эмфиземы
- е кистозной дисплазии легкого
- ж диафрагмальной грыжи
- з опухоли средостения

16. Часто болеющего ОРВИ и пневмонией ребенка раннего возраста необходимо:

- а. наблюдать у иммунолога
- б проводить закаливание
- в направить на обследование к хирургу
- г направить к фтизиатру

Ответы:

1 б д е ж. 2 б. 3 д. 4 е. 5 ж. 6 в з. 7 з. 8 в. 9 а, б, в, г. 10 в. 11 е. 12 д. 13 з. 14 б . 15 ж. 16 в.