

Вас вызвали к ребенку 2 лет, который опрокинул на себя чашку с горячим чаем

Укажите все правильные ответы

1. При первичном осмотре врач должен оценить
 - а степень ожога
 - б тяжесть ожога
 - в площадь ожога
 - г тяжесть состояния больного
 - д степень обезвоживания

2. Гиперемия и отек кожи передней грудной стенки и живота указывает на:
 - а) ожога 1 ст
 - б) ожога 2 ст
 - в) ожога 3 ст
 - г) ожога 4 ст
 - д) площадь 13%
 - е) площадь 45%

3. Гиперемия и отек кожи с пузырями с прозрачной жидкостью на передней грудной стенке и животе указывает на:
 - а) ожога 1 ст
 - б) ожога 2 ст
 - в) ожога 3 ст
 - г) ожога 4 ст
 - д) площадь 18%
 - е) площадь 45%

4. Оценка площади ожога проводится по схеме
 - а) «правило девяток»
 - б) «правило ладони»
 - в) по УЗИ
 - г) «правило четверок»
 - д) «правило ступни»
 - е) «правило «кальки»

Укажите правильный ответ

5. Ожог грудной и брюшной стенки 1 степени у ребенка 2-х лет сопровождается ли ожоговым шоком

- а да
- б нет

6. Ожог грудной и брюшной стенки 2 степени у ребенка 2-х лет сопровождается ли ожоговым шоком

- а да
- б нет

7. Выявленные при осмотре ребенка симптомы: возбуждение, болезненный плач, негативная реакция на осмотр, гипертермия, тахикардия - указывают на:

- а эректильную фазу шока
- б торпидную фазу шока
- в отсутствие симптомов шока

Укажите все правильные ответы

8. Диагностическая скрининговая программа степени тяжести ожогового шока включает оценку:

- а частоты пульса
- б частоты дыхания
- в измерения АД
- г определение Нв, Нт
- д почасового диуреза
- е температуры тела

9. Неотложная помощь на догоспитальном этапе у ребенка с ожогом включает

- а) наложение асептической повязки
- б) наложение мажевой повязки
- в) вскрытие и дренирование «пузырей»
- г) охлаждение поверхности ожога
- д) экстренная госпитализация
- е) обезболивание

Ответы:

1. а,в,г. 2 а,д. 3 б,д. 4 а, б. 5 а. 6 а. 7 а. 8 а,в,г,д. 9 а, г, д, е.

В поликлинику доставлен ребенок, после длительного нахождения на улице в мороз.

Укажите все правильные ответы

1. При первичном осмотре врач должен оценить
 - а степень отморожения
 - б тяжесть отморожения
 - в площадь отморожения
 - г состояние общего замерзания
 - д степень обезвоживания

Укажите правильный ответ

2. Активные жалобы ребенка на боли в кистях рук и стопах, последние при первичном осмотре холодные, кожа бледная, нечувствительная – указывают на:
 - а отморожение 1 степени
 - б отморожение 2 степени
 - в отморожение 3 степени
 - г общее замерзание
 - д отморожение, степень определить невозможно

Укажите все правильные ответы

3. Неотложная помощь на догоспитальном этапе у ребенка с отморожением включает

- а) наложение термоизолирующей повязки
- б) наложение мазевой повязки
- в) вскрытие и дренирование «пузырей»
- г) теплая ванна и растирание
- д) использование общего согревания

4. Длительность наложения термоизолирующей повязки и общего согревания определяется

- а восстановлением чувствительности тканей
- б ощущением жара в пальцах
- в нормализацией температуры тела
- г нормализацией пульса
- д нормализацией АД

Укажите правильный ответ

5. Формирование пузырей с прозрачной жидкостью является симптомом

- а) с-м Лайелла
- б) отморожении 2 ст
- в) отморожения 1 степени

6. После снятия теплоизолирующей повязки местное лечение включает

- а повязку с мазью Вишневского
- б полуспиртовой компресс
- в асептическую повязку
- г фиксацию на гипсовой лангете

Ответы:

1.в,г. 2 д. 3 а, д. 4 а,б. 5 б. 6 а