

**Тестовые задания по детской хирургии, анестезиологии и
реаниматологии для лечебного факультета**
(правильный ответ выделен жирным шрифтом)

**1. Кишечная непроходимость, острый живот.
Острый аппендицит.**

Укажите все правильные ответы

**1. ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ СИМПТОМАМИ ПОЛНОЙ
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- а рвота пищей
- б вздутие живота**
- в ассиметрия живота
- г отсутствие стула и газов
- д выделение крови из прямой кишки
- е рвота с патологическими примесями**

2. К ВЫСОКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ОТНОСЯТСЯ

- а атрезия ануса
- б атрезия дуоденум**
- в атрезия тощей кишки
- г болезнь Гиршпрунга
- д синдром Ледда
- е пилоростеноз**

3. К НИЗКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ОТНОСЯТСЯ

- а атрезия ануса**
- б атрезия дуоденум
- в атрезия тощей кишки
- г болезнь Гиршпрунга
- д синдром Ледда
- е мекониевый илеус**

Укажите правильный ответ

**4. УРОВНЕМ ДЕЛЕНИЯ НА ВЫСОКУЮ И НИЗКУЮ КИШЕЧНУЮ
НЕПРОХОДИМОСТЬ У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- а середина тонкой кишки
- б трейцева связка**

- в илеоцекальный угол
- г привратник

Укажите все правильные ответы

5. ОБТУРАЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- а атрезии ануса
- б атрезии дуоденум
- в атрезии тощей кишки
- г болезни Гиршпрунга
- д синдроме Ледда
- е мекониевом илеусе

6. СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- а инвагинации
- б ущемленной грыже
- в атрезии тощей кишки
- г болезни Гиршпрунга
- д синдроме Ледда
- е мекониевом илеусе

7. СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- а острым внезапным началом
- б периодическим беспокойством
- в застойной рвотой
- г рефлекторной рвотой
- д болезненным напряженным животом
- е выделением крови из прямой кишки

8. ВЫСОКАЯ ОБТУРАЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- а рвотой желчью, зеленью
- б рвотой кишечным содержимым
- в запавшего живота
- г болезненного живота
- д в прямой кишке - слизистые пробки
- е в прямой кишке слизь с кровью

**9. ВЫСОКАЯ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ**

- а** рвотой желчью, зеленью
- б** рвотой кишечным содержимым
- в** запавшего живота
- г** болезненного живота
- д** в прямой кишке - слизистые пробки
- е** в прямой кишке слизь с кровью

**10. НИЗКАЯ ОБТУРАЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ**

- а** рвотой желчью, зеленью
- б** рвотой кишечным содержимым
- в** вздутым животом
- г** болезненным животом
- д** в прямой кишке - слизистые пробки
- е** в прямой кишке слизь с кровью

**11. НИЗКАЯ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ**

- а** рвотой желчью, зеленью
- б** рвотой кишечным содержимым
- в** вздутым животом
- г** болезненный живот
- д** в прямой кишке - слизистые пробки
- е** в прямой кишке слизь с кровью

**12. ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ
СИМПТОМАМИ**

- а** рвотой желчью
- б** рвотой кишечным содержимым
- в** вздутым животом
- г** болезненный живот
- д** в прямой кишке - слизистые пробки
- е** в прямой кишке меконий

Дополнить

**13. ПАРЕТИЧЕСКАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ВОЗНИКАЕТ
ВСЛЕДСТВИИ -----**

Ответ: инфекционного токсикоза

14. СПАСТИЧЕСКАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИИ -----

Ответ: перинатальной гипоксии

Укажите все правильные ответы

15. ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЗЫВАЕТ

- а** спазм сфинктеров
- б** усиление перистальтики
- в** атонию полых органов
- г** снижение секреторной функции

Установить правильную последовательность

16. ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО С КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

- /1 / Обзорная рентгенография брюшной полости
- /2/ Клинический осмотр
- /3 / Зондирование желудка
- /4 / Контрастная рентгенография
- /5 / Очистительная клизма
- /6 / Лабораторные анализы

Ответ: 2, 3, 5, 6, 1,4

Укажите правильный ответ

17. ВЕДУЩИМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- а** уровни жидкости в кишечных петлях
- б** равномерное повышенное газонаполнение кишечника
- в** свободный газ в брюшной полости
- г** наличие уровня жидкости в свободной брюшной полости

Укажите все правильные ответы

18. ДЛЯ ВЫСОКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ХАРАКТЕРНЫ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- а затемнение брюшной полости
- б** один уровень жидкости
- в два уровня жидкости
- г множественные уровни жидкости
- д повышенное равномерное газонаполнение кишечника
- е серп воздуха под диафрагмой

Укажите правильный ответ

19. ДЛЯ НИЗКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ХАРАКТЕРНЫ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- а затемнение брюшной полости
- б** один уровень жидкости
- в два уровня жидкости
- г множественные уровни жидкости
- д повышенное равномерное газонаполнение кишечника
- е серп воздуха под диафрагмой

20. ДЛЯ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ХАРАКТЕРЕН РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПТОМ

- а затемнение брюшной полости
- б** один уровень жидкости
- в два уровня жидкости
- г множественные уровни жидкости
- д повышенное равномерное газонаполнение кишечника
- е серп воздуха под диафрагмой

Укажите все правильные ответы

21. ДЛЯ ПАРЕТИЧЕСКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ХАРАКТЕРНЫ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

- а затемнение брюшной полости
- б** в уровнях жидкости меньше чем газа
- в в уровнях жидкости больше чем газа
- г множественные уровни жидкости
- д повышенное равномерное газонаполнение кишечника
- е серп воздуха под диафрагмой

22. К УРГЕНТНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- а атрезия дуоденум
- б** синдром Ледда
- в болезнь Гиршпрунга
- г перитонит

- д мекониевый илеус
- е пилоростеноз

Укажите все правильные ответы

39 . ВРОЖДЕННЫЙ ПИЛОРОСТЕНОЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- а срыгивания молоком с рождения
- б рвотой створоженным молоком с 3-4 недель
- в "мокрой подушки"
- г метаболическим алкалозом
- д запорами
- е полиурией

40. ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПИЛОРОСТЕНОЗЕ В АНАЛИЗАХ ОТМЕЧАЕТСЯ

- а метаболический ацидоз
- б метаболический алкалоз
- в КЩС норма
- г гипокалиемия
- д гипернатриемия
- е гипохлоремия

41. ВРОЖДЕННЫЙ ПИЛОРОСТЕНОЗ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ МЕТОДАМИ

- а УЗИ внутренних органов
- б фиброгастроскопии
- в рентгенографии контрастной
- г рентгенографии в положении Тренделенбурга
- д ирригографии
- е компьютерной томографии

42 ИНВАГИНАЦИЯ У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМИ СИМПТОМАМИ

- а острое внезапное начало
- б гипертермия
- в периодическое беспокойство
- г постоянное беспокойство
- д неукротимая рвота
- е стул с кровью
- ж выделения слизи и крови из прямой кишки

Дополнить

43 ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИИ РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ _____

Ответ: пневмоирригографию

Установить соответствие

Укажите правильный ответ

44. РАННЯЯ СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО

- а** обтурационной
- б** странгуляционной

Укажите все правильные ответы

45. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНО НА РАННИХ СТАДИЯХ

- а** инвагинации
- б** спаечно-паретической непроходимости
- в** ранней спаечной непроходимости
- г** поздней спаечной непроходимости

46. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- а** обзорная рентгенография лежа
- б** обзорная рентгенография стоя
- в** рентгеноскопия по Вангенстину
- г** УЗИ органов брюшной полости
- д** компьютерная томография
- е** рентгеноконтрастное исследование с барием

47 ИНВАГИНАЦИЯ У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМИ СИМПТОМАМИ

- а** острое внезапное начало
- б** гипертермия
- в** периодическое беспокойство
- г** постоянное беспокойство
- д** неукротимая рвота
- е** стул с кровью

ж выделения слизи и крови из прямой кишки
Дополнить

48 ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИИ РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ _____

Ответ: пневмоирригографию

Укажите правильный ответ

49. РАННЯЯ СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО

- а** обтурационной
- б** странгуляционной

Укажите все правильные ответы

50. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНО НА РАННИХ СТАДИЯХ

- а** инвагинации
- б** спаечно-паретической непроходимости
- в** ранней спаечной непроходимости
- г** поздней спаечной непроходимости

51. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- а** обзорная рентгенография лежа
- б** обзорная рентгенография стоя
- в** рентгеноскопия по Вангенстину
- г** УЗИ органов брюшной полости
- д** компьютерная томография
- е** рентгеноконтрастное исследование с барием

Укажите все правильные ответы

52. ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАПОРОВ ВКЛЮЧАЕТ

- а** Диета
- б** ЛФК
- в** Физиотерапия
- г** Лапароскопия
- д** Ректороманоскопия

2. О.живот. Перитонит

Укажите все правильные ответы

53. ОСНОВНЫМИ ТРЕМЯ СИМПТОМАМИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- а** рвота
- б** понос
- в** локальная болезненность в правой подвздошной области
- г** болезненность в области пупка
- д** пассивная мышечная защита брюшной стенки
- е** положительный симптом Щеткина-Блюмберга
- ж** положительный симптом Ортенера
- з** положительный симптом Пастернацкого

Указать правильный ответ.

54. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КАРТИНЫ КРОВИ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- а** умеренный лейкоцитоз, нейтрофилез
- б** гиперлейкоцитоз, нейтрофилез
- в** лейкопения
- г** отсутствие изменений
- д** ускоренное СОЭ.

55. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КАРТИНЫ КРОВИ ПРИ КРИПТОГЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- а** умеренный лейкоцитоз, нейтрофилез
- б** гиперлейкоцитоз, нейтрофилез
- в** лейкопения
- г** отсутствие изменений
- д** ускоренное СОЭ.

Укажите все правильные ответы

56. БОЛИ В ЖИВОТЕ У РЕБЕНКА ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ ПРИ

- а** остром аппендиците
- б** мезадените
- в** пневмонии
- г** сиалоадените
- д** опухоли Вильмса

е пиелонефрите

Укажите правильный ответ

57 БОЛЬНОЙ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ:

- а на спине;
- б на животе;
- в на правом боку с приведенными ногами;
- г на левом боку;
- д сидя.

68. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- а локальная боль, температура и рвота
- б активное напряжение мышц брюшной стенки и рвота
- в пассивное напряжение мышц брюшной стенки и локальная болезненность;
- г симптом Ортнера и рвота;
- д температура, жидкий стул и рвота.

Укажите правильные ответы

59. ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ

- а локальная боль в эпигастрии
- б локальная боль в обл. пупка
- в локальная боль в прав. подвздошной области
- г активное напряжение мышц живота
- д пассивная мышечная защита
- е положительный симптом Щеткина-Блюмберга
- ж положительный симптом Пастернацкого

60 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ ИСПОЛЬЗУЮТ

- а реланиум
- б масочный наркоз
- в осмотр во время естественного сна
- г медикаментозный сон с хлоралгидратом

61 ПЕРИТОНИТ У ДЕТЕЙ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- а** аппендицита
- б** аднексита
- в** меккелева дивертикулита
- г** инвагинации
- д** кишечной непроходимости
- е** деструктивной пневмонии

62. ОСОБЕННОСТИ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ

- а** недоразвитие сальника
- б** снижение пластических функций брюшины
- в** преобладание эксудации в воспалительном процессе
- г** особенности возбудителя
- д** малый объем брюшной полости

63. КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КРИПТОГЕННОГО ПЕРИТОНИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- а** гипертермия
- б** субфебрилитет
- в** боли в животе
- г** понос и рвота
- д** пассивное напряжение мышц живота
- е** активное напряжение мышц живота

Укажите правильный ответ

64. КРИПТОГЕННЫЙ ПЕРИТОНИТ ВОЗНИКАЕТ У

- а** девочек до 3-х лет
- б** девочек старше 12 лет
- в** мальчиков до 1 года
- г** мальчиков старше 14 лет

Укажите все правильные ответы

65. НАЗОВИТЕ ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К “ОСТРОМУ ЖИВОТУ”

- а** нарушения кровообращения в органах брюшной полости.

- б** острые нарушения проходимости по желудочно-кишечному тракту
- в** острые воспалительные заболевания брюшной полости
- г** кровотечения в просвет полых органов или в брюшную полость
- д** объемные образования брюшной полости

66. НАЗОВИТЕ ОБЩИЕ СИМПТОМЫ “ОСТРОГО ЖИВОТА” У ДЕТЕЙ

- а** лихорадка
- б** рвота
- в** расстройства стула
- г** нистагм
- д** жидкий стул

67. НАЗОВИТЕ МЕСТНЫЕ СИМПТОМЫ “ОСТРОГО ЖИВОТА” У ДЕТЕЙ

- а** болезненность при пальпации
- б** вздутие живота
- в** симптомы раздражения брюшины
- г** симптом Маркса
- д** напряжение мышц живота
- е** симптом Дешана

68. НАЗОВИТЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИНФОРМАТИВНЫЕ ПРИ “ОСТРОМ ЖИВОТЕ”

- а** лапароскопия
- б** ректороманоскопия
- в** ФЭГДС
- г** радиоизотопное исследование
- д** УЗИ
- е** рентгенография

Дополнить

69. ПО ЭТИОЛОГИИ ПЕРИТОНИТ У НОВОРОЖДЕННЫХ КАК ПРАВИЛО-----

Ответ перфоративный

Гнойная хирургическая инфекция

Укажите все правильные ответы

70. К ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- а** некротическая флегмона новорожденных
- б** адипонекроз
- в** вторичная флегмона
- г** аденофлегмона
- д** рожа
- е** синдром Казабах-Меррит

Дополнить

71. ЛОКАЛЬНЫМИ СИМПТОМАМИ ВОСПАЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

tumor, dolor, rubor, functia lesae и -----

Ответ: color

Укажите все правильные ответы

72. У НОВОРОЖДЕННЫХ НЕКРОТИЧЕСКАЯ ФЛЕГМОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- а** пятнистая гиперемия
- б** разлитая гиперемия
- в** инфильтрация сплошная
- г** инфильтрация бугристая
- д** повышение местной температуры
- е** распространяется
- ж** функция нарушена

Укажите правильный ответ

73. У НОВОРОЖДЕННЫХ РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОЗБУДИТЕЛЬ

- а** стафилококк
- б** стрептококк
- в** протей
- г** синегнойная палочка
- д** клебсиелла
- е** анаэробы

Укажите все правильные ответы

74. У НОВОРОЖДЕННЫХ РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- а** пятнистая гиперемия
- б** разлитая гиперемия
- в** инфильтрация сплошная
- г** инфильтрация бугристая
- д** местная температура норма
- е** локальная болезненность
- ж** распространяется

75. К СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- а** сиалоаденит
- б** фурункулез
- в** парапроктит
- г** флегмона
- д** панариций
- е** рожа
- ж** абсцедирующий лимфаденит

Укажите правильный ответ

76. ПАРАПРОКТИТ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ НАГНОЕНИЯ

- а** кисты крестцово-копчиковой
- б** тератомы
- в** параректальной кисты
- г** полипа

Установить соответствие

77 ВИД ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1 абсцесс
- 2 флегмона
- 3 рожа
- 4 гнойный мастит,

ТАКТИКА

- а** консервативное лечение
- б** вскрытие одним разрезом
- в** вскрытие множественными разрезами
- г** радикальное иссечение гнойного очага
- д** вскрытие радиальными разрезами

Ответ: 1-б , 2-в , 3-а , 4-д.

Укажите все правильные ответы

78. РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КОЖИ БЫВАЕТ

- а узловатым
- б эритематозным**
- в флегмонозным
- г буллезным
- д гангренозным
- е абсцедирующим
- ж инфильтративным

Укажите правильный ответ

79. РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ОБЛАСТИ

- а нижней части живота
- б лица и шеи**
- в голеней
- г предплечий

Укажите все правильные ответы

80. МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОЙ РАНЫ ТРЕБУЕТ

- а промывания перекисью водорода**
- б промывание раствором марганца
- в теплые ванночки с марганцем**
- г повязку с Левомиколем
- д УВЧ
- е повязку с мазью Вишневского

81. МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ ТРЕБУЕТ

- а теплые марганцевые ванночки
- б повязки с Левомиколем**
- в повязки с мазью Вишневского
- г УВЧ
- д УФО

82. У РЕБЕНКА С ОСТРЫМ ДИАФИЗАРНЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ В 1-3 СУТКИ НАБЛЮДАЮТСЯ СИМПТОМЫ

- а** местная гипертермия
- б** флюктуация
- в** нарушение функции ближайшего сустава
- г** боль при пальпации
- д** боль при перкуссии
- е** выраженный венозный рисунок
- ж** боль при нагрузке по оси конечности
- з** локальный отек

Дополнить

83. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С -----

Ответ: переломом

Укажите правильный ответ

84. РАННИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ

- а** в течение первой недели
- б** на 2 неделе
- в** на 3 неделе
- г** после месяца

Укажите правильные ответы

85. ДЛЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ РАННИЕ СИМПТОМЫ

- а** острое начало
- б** постепенное начало
- в** стойкая гипертермия >38
- г** нарушение функции
- д** резкая локальная боль
- е** вынужденное положение конечности
- ж** боль при перкуссии
- з** усиление боли при пассивных и активных движениях конечности
- и** летучие боли в суставах

86 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО

ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С

- а** туберкулезом
- б** ревматоидным артритом
- в** рахитом
- г** флегмоной
- д** травмой
- е** саркомой
- ж** остеобластокластомой

87 РАННИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО МЕТАДИАФИЗАРНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- а** линейной периостальной реакцией
- б** нечеткостью структуры костных балок
- в** наличием очагов деструкции
- г** расширением суставной щели
- д** игольчатым периоститом
- е** с-мом "луковичной кожуры"

88 ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ СОСТОЯТ ИЗ

- а** остеоперфорации
- б** дренировании гнойных затеков
- в** промывании костной полости антисептиками
- г** иммобилизации конечности лангетой
- д** вытяжении по Шеде
- е** мазовыми повязками, консервативно

89 ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА СОСТОЯТ ИЗ

- а** остеоперфорации
- б** дренировании гнойных затеков
- в** промывании костной полости антисептиками
- г** иммобилизации конечности лангетой
- д** вытяжении по Шеде
- е** мазовыми повязками, консервативно

90. ХИРУРГИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ НАЗЫВАЮТ

- а** любые инфекции, возникающие в хирургическом стационаре;

- б** инфекции, в лечении которых используются хирургические методы;
- в** любые инфекции, возникающие в послеоперационном периоде;
- г** инфекции, вызванные резистентной микрофлорой;
- д** инфекции, являющиеся осложнением операций и травм.

Укажите правильный ответ

91. ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРАЖАЕТСЯ ОТДЕЛ КОСТИ

- а** эпифизарный
- б** метаэпифизарный
- в** метадиафизарный
- г** диафизарный
- д** суставная поверхность

Укажите правильный ответ

92. ПРИ АРТРИТЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРАЖАЕТСЯ ОТДЕЛ КОСТИ

- а** эпифизарный
- б** метаэпифизарный
- в** метадиафизарный
- г** диафизарный
- д** суставная поверхность

Укажите все правильные ответы

93. КЛИНИЧЕСКИ ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ МЕТАЭПИФИЗАРНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- а** парезом ручки
- б** патологической подвижностью
- в** болезненностью при сгибании - разгибании
- г** болезненность ротационных движений
- д** отсутствием активных движений

94. КЛИНИЧЕСКИ ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ МЕТАЭПИФИЗАРНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ КОСТЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- а** парезом стопы
- б** сгибательной контрактурой в ножках
- в** болезненностью при сгибании - разгибании
- г** болезненность ротационных движений
- д** отсутствием активных движений

е патологической подвижностью

Укажите правильный ответ

95. ЕДИНСТВЕННЫМ СИМПТОМОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ОТ ПАРЕЗА N. PIRONEUS ЯВЛЯЕТСЯ

- а сгибательная контрактура в суставах
- б болезненность при сгибании - разгибании
- в болезненность при ротационных движениях
- г отсутствие активных движений

Укажите правильный ответ

96. ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ НА

- а первые сутки
- б 5 – 6 день
- в 10 сутки
- г 21 день

97. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ОСТРОГО АРТРИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

- а разряжение костной структуры метафиза
- б разряжение костной структуры диафиза
- в дефекты суставной поверхности кости
- г диафизарный периостит
- д наличие секвестра
- е “игольчатый” периостит
- ж отсутствие видимых изменений кости

Укажите все правильные ответы

98. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

- а разряжение костной структуры метафиза
- б разряжение костной структуры диафиза
- в дефекты суставной поверхности кости
- г диафизарный периостит
- д наличие секвестра
- е “игольчатый” периостит

ж отсутствие видимых изменений кости

Дополнить

99.ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО ОСТЕОАРТРИТА ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ-----

Ответ: патологический вывих

Укажите все правильные ответы

100. КАКОЕ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ

- а патологический перелом
- б патологический вывих
- в нарушение роста конечности в длину.

Тема 2

Пороки развития легких, пищевода, диафрагмы

101. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ВНУТРИГРУДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТНОСЯТСЯ

- а пневмоторакс
- б ателектаз легкого
- в диафрагмальная грыжа
- г атрезия пищевода
- д респираторный дистресс синдром
- е релаксация диафрагмы

102 ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ВНУТРИГРУДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- а смещение средостения в сторону поражения
- б расширение межреберных промежутков на стороне поражения
- в патология перкуторного звука на стороне поражения
- г двустороннее поражение грудной клетки
- д патология аускультативного звука на стороне поражения

103. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ВНУТРИГРУДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

а смещение средостения в сторону противоположную патологии

б медиастанальная грыжа

в низкое стояние купола диафрагмы на стороне поражения

г сужение межреберных промежутков на стороне поражения

д симметричное поражение легких

104. ВНУТРИГРУДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОЯВЛЯЮТСЯ

а респираторный дистресс синдром

б врожденная долевая эмфизема

в ложная диафрагмальная грыжа

г спонтанный пневмоторакс

д релаксация купола диафрагмы

е ателектаз легкого

ж гидроторакс

105. СМЕЩЕНИЕМ СРЕДОСТЕНИЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ

а респираторный дистресс синдром

б врожденная долевая эмфизема

в агенезия легкого

г спонтанный пневмоторакс

д релаксация купола диафрагмы

е ателектаз легкого

ж гидроторакс

106. ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ ВНУТРИГРУДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ХАРАКТЕРНО

а патология односторонняя

б патология двусторонняя

в смещение средостения в сторону патологии

г смещение средостения в противоположную сторону

д без смещения средостения

107. ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ СРЕДОСТЕНИЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНО

а патология односторонняя

б патология двусторонняя

в смещение средостения в сторону патологии

г смещение средостения в противоположную сторону

д без смещения средостения

108. ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ ДВУСТОРОННИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНО

- а** патология односторонняя
- б** патология двусторонняя
- в** смещение средостения в сторону патологии
- г** смещение средостения в противоположную сторону
- д** без смещения средостения

Укажите правильный ответ

109. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВРОЖДЕННОЙ ДОЛЕВОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- а** аплазия, гипоплазия хряща долевого бронха
- б** аспирация мекония
- в** аномальное отхождение легочных сосудов
- г** опухоли средостения
- д** дефицит сульфактанта

Укажите все правильные ответы

110. ВРОЖДЕННАЯ ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- а** живот запавший
- б** вздутие грудной клетки
- в** сердечные тоны смещены в здоровую сторону
- г** на стороне патологии дыхание не проводится
- д** средостение смещено в большую сторону
- е** на стороне поражения перкуторно притупление
- ж** на стороне поражения мозаичность перкуторного звука

Дополнить

111. РЕБЕНКУ С АТЕЛЕКТАЗОМ ЛЕГКОГО ПОКАЗАНА СРОЧНАЯ

Ответ : бронхоскопия

Укажите все правильные ответы

112. РЕЛАКСАЦИЯ КУПОЛА ДИАФРАГМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ

- а пункции плевральной полости
- б** пункции подключичной вены
- в дренировании плевральной полости
- г при осложненных родах
- д медиастените
- е порока развития

Укажите номер правильного ответа

113. ТРАНСПОРТИРОВКА НОВОРОЖДЕННОГО С СИНДРОМОМ ВНУТРИГРУДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- а горизонтальное
- б** возвышенное на здоровом боку
- в возвышенное на больном боку

Укажите правильный ответ

114. РЕБЕНКУ С НАПРЯЖЕННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ЭКСТРЕННО

- а оперативное вмешательство
- б** плевральную пункцию
- в бронхоскопию
- г наблюдение

115. ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДОЛЕВОЙ ЭМФИЗЕМЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЕТСЯ

- а нижняя доля справа;
- б** верхняя доля слева;
- в нижняя доля слева;
- г верхняя доля справа;
- д средняя доля правого легкого.

Укажите все правильные ответы

116. К ПОРОКАМ РАЗВИТИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ВНУТРИГРУДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТНОСЯТСЯ

- а** врожденная долевая эмфизема
- б** агенезия легкого
- в** секвестрация легкого
- г** бронхоэктатическая болезнь
- д** поликистоз легкого
- е** спонтанный пневмоторакс

Укажите все правильные ответы

117. ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ВРОЖДЕННОЙ ДОЛЕВОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- а** отсутствие дыхания на больной стороне
- б** смещение средостения в здоровую сторону
- в** перкуторно коробочный звук на больной стороне
- г** перкуторно притупление звука на больной стороне
- д** средостение не смещено

118. К СМЕЩЕНИЮ СРЕДОСТЕНИЯ В БОЛЬНУЮ СТОРОНУ ПРИВОДЯТ

- а** пневморакс
- б** агенезия легкого
- в** ателектаз легкого
- г** аплазия легкого
- д** секвестрация легкого

Укажите правильный ответ

119. ОТСУТСТВИЕ УСТЬЯ ОДНОГО ИЗ БРОНХОВ ВО ВРЕМЯ БРОНХОСКОПИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- а** Агенезии легкого
- б** Аплазии легкого
- в** Гипоплазии легкого
- г** Секвестрации легкого

120. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛОБАРНУЮ ЭМФИЗЕМУ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- а** Обзорную рентгенографию грудной клетки
- б** Бронхоскопию
- в** Бронхографию
- г** Грудную аорторграфию
- д** Компьютерную томографию грудной полости

121. ОСНОВНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- а** гнойное воспаление
- б** малигнизация
- в** кровотечение
- г** гипертензия малого круга

Укажите все правильные ответы

122. ВЕДУЩИМИ СИМПТОМАМИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ

- а** сухой кашель
- б** влажный кашель
- в** интоксикация
- г** частые пневмонии

123. ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ЧАСТО ПРИ ПОРОКАХ

- а** агенезия легкого
- б** ателектаз легкого
- в** гипоплазия легкого
- г** бронхоэктатическая болезнь
- д** врожденная лобарная эмфизема
- е** секвестрация легкого
- ж** врожденные кисты легкого

Укажите правильный ответ

124. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕГОЧНУЮ СЕКВЕСТРАЦИЮ

- а** Компьютерная томография грудной полости
- б** Компьютерная томография грудной полости с внутривенным введением контрастного вещества
- в** Бронхоскопия
- г** Бронхография
- д** Радиоизотопное исследование легких

125. ТИПИЧНЫМ МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВНЕДОЛЕВОГО ЛЕГОЧНОГО СЕКВЕСТРА ЯВЛЯЕТСЯ

- а** Задне-нижние отделы плевральной полости
- б** Передне-нижние отделы плевральной полости
- в** Верхние отделы плевральной полости
- г** Прикорневые отделы легких

Укажите все правильные ответы

**126. ДЛЯ НАПРЯЖЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ КИСТЫ ЛЕГКОГО
ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ**

- а** Ослабление дыхания на стороне поражения
- б** Наличие при перкуссии легочного звука с коробочным оттенком
- в** Смещение средостения в противоположную сторону
- г** Стойкая гипертермия
- д** Перегрузки камер сердца
- е** Легочная гипертензия

127. ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХОЭКТАЗИИ МОГУТ БЫТЬ

- а** воспалительные заболевания органов дыхания
- б** врожденные пороки легких
- в** инородные тела бронхов
- г** инородные тела пищевода
- д** аспирация
- е** ателектаз легкого

Укажите правильный ответ

**128. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ БРОНХОЭКТАЗИИ
ЯВЛЯЕТСЯ**

- а** влажный кашель обильной мокротой по утрам
- б** сухой кашель по утрам
- в** влажный кашель вечером
- г** кровохаркание

Укажите все правильные ответы

**129. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА БРОНХОЭКТАЗИЯ
ПОКАЗАНЫ**

- а** бронхоскопия
- б** бронхография
- в** ангиография
- г** КТ легких

д радиоизотопное исследование легких
е торакоскопия

Укажите правильный ответ

130. НАИБОЛЕЕ БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ БРОНХОЭКТАЗИИ ВЫЗЫВАЮТ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

- а пластмассовые
- б металлические
- в органические
- г стеклянные

131. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- а рентгеноскопия
- б бронхоскопия
- в полипозиционная КТ
- г бронхография
- д рентгенография в 2-х проекциях

Дополнить

132. ДЕСТРУКЦИЯ ЛЕГКИХ С ПЛЕВРАЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ИНФЕКЦИИ-----

Ответ: стафилококковой

133. АБСЦЕССЫ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФЕКЦИИ ----

Ответ: грамотрицательной

134. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ _____

Ответ: рентгенография

Укажите все правильные ответы

135. В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

- а** напряженный пиопневмоторакс
- б** пневмоторакс
- в** инфильтрат
- г** плащевидный плеврит
- д** абсцесс

Укажите правильный ответ

136. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПНЕВМОНИИ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ У ДЕТЕЙ

- а** до 3 лет
- б** от 3 до 5 лет
- в** от 5 до 7 лет
- г** старше 7 лет

Укажите все правильные ответы

137. К ПЛЕВРАЛЬНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ

- а** пневмоторакс
- б** пиопневмоторакс
- в** пиоторакс
- г** абсцесс легкого
- д** буллы
- е** плащевидный плеврит

Дополнить

138. К СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМ ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ-----

Ответ : УЗИ

Ожоги и рубцовые стенозы пищевода.

Укажите правильный ответ

139. ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА РЕБЕНКУ, ВЫПИВШЕМУ ГЛОТОК УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- а** щелочным раствором;
- б** подкисленным раствором;

- в холодной водой;
- г** водой комнатной температуры;
- д горячей водой.

140. ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА РЕБЕНКУ, ВЫПИВШЕМУ ГЛОТОК ЕДКОЙ ЩЕЛОЧИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- а холодной водой;
- б** водой комнатной температуры;
- в горячей водой;
- г подкисленным раствором;
- д щелочным раствором.

Дополнить

141. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПОЛОСТИ РТА И ПИЩЕВОДА ЕДКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В _____ ЖЕЛУДКА

Ответ: промывании

Укажите правильный ответ

142. ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ДЕТЯМ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ

- а** через зонд
- б приемом большого количества
- в воды с вызыванием рвоты

Дополнить

143. РУБЦОВЫЕ СУЖЕНИЯ ПИЩЕВОДА ВОЗМОЖНЫ ПРИ ОЖОГАХ _____ СТЕПЕНИ

Ответ : третьей

144. ПРОФИЛАКТИКОЙ РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ПИЩЕВОДА ПРИ ОЖОГАХ ЯВЛЯЕТСЯ _____

Ответ: бужирование

Укажите все правильные ответы

145. ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ОЖОГА РОТОГЛОТКИ И ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЮТСЯ

- а** диарея
- б** дисфагия
- в** саливация
- г** анемия
- д** наложения фибрина на слизистых
- е** осиплость голоса
- ж** сухость полости рта

Дополнить

146. РЕБЕНОК С ОЖОГОМ ПИЩЕВОДА 3 СТЕПЕНИ ДОЛЖЕН НАБЛЮДАТЬСЯ ХИРУРГОМ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО _____

Ответ: года

Укажите все правильные ответы

147. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА РУБЦОВОГО СУЖЕНИЯ ПИЩЕВОДА ВЫПОЛНЯЮТ

- а** обзорную рентгенографию грудной клетки
- б** контрастную рентгеноскопию пищевода
- в** двойное контрастирование пищевода
- г** эзофагоскопию
- д** анализ крови
- е** УЗИ
- ж** радиоизотопное исследование

148. ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ПЕРФОРАЦИИ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЮТСЯ

- а** головная боль
- б** дисфагия
- в** боли за грудиной
- г** крепитация на шее
- д** гипертермия
- е** рвота кровью

149. ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПИЩЕВОДА ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- а** рвота
- б** отказ от еды
- в** саливация

- г одышка
- д гипертермия
- е затруднение глотания
- ж загрудинные боли

Пороки развития пищевода. Желудочно-пищеводный рефлюкс.

Укажите правильный ответ

150. ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПИЩЕВОД ДОСТИГАЕТ К:

- а 3-м месяцам;
- б 6-ти - 24 месяцам;**
- в 3-м годам;
- г 5-ти годам;

Укажите все правильные ответы

151. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕДОСТАТОЧНОСТИ КАРДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА НЕОБХОДИМО

- а контрастное обследование пищевода в положении стоя;
- б жесткая эзофагоскопия ;
- в контрастное обследование пищевода в положении лежа;
- г фиброэзофагоскопия ;
- д 24-часовая рН-метрия .**

152. К АСПИРАЦИОННОМУ СИНДРОМУ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИВОДЯТ

- а атрезия пищевода**
- б ложная диафрагмальная грыжа
- в двойная дуга аорты
- г рефлюкс-эзофагит
- д ахалазия кардии
- е парез диафрагмы
- ж трахео-пищеводный свищ**

153. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАРДИИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

- а халазии кардии**
- б диафрагмально-плевральной грыже
- в врожденном стенозе пищевода
- г врожденном коротком пищеводе
- д грыже пищеводного отверстия диафрагмы**

е ахалазии кардии

154. ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС ОСЛОЖНЯЕТСЯ

- а стенозом кардиального отдела пищевода
- б** стенозом пищевода на границе средней и нижней трети
- в дивертикулом пищевода
- г перфорацией пищевода
- д мегаэзофагусом
- е язвенно-эрозивным эзофагитом
- ж респираторным синдром
- з хронической анемией

155. К ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНОМУ РЕФЛЮКСУ ПРИВОДЯТ АНАТОМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

- а тупой угол Гисса
- б высокое стояние купола диафрагмы
- в спленомегалия
- г широкое эзофагеальное кольцо
- д зубчатая линия выше эзофагеального кольца
- е мегаэзофагус

156. В ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНОГО РЕФЛЮКСА ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИМЕЮТ

- а сонография
- б ангиография
- в рН-метрия пищевода и желудка
- г рентгеноконтрастное исследование желудка
- д обзорная рентгенография грудной клетки
- е фиброэзофагогастродуоденоскопия

Укажите правильный ответ

157. АНЕМИЯ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНОМ РЕФЛЮКСЕ СВЯЗАНА С

- а голоданием
- б травмой слизистой желудка
- в рвотой
- г эрозивно-язвенным эзофагитом

Укажите все правильные ответы

158. ИЗ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ У ДЕТЕЙ

- а френоперикардальная
- б передние
- в пищевода отверстия
- г задние ложные
- д истинные

Укажите правильный ответ

159. ВРОЖДЕННЫЕ СТЕНОЗЫ ПИЩЕВОДА ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ НА УРОВНЕ

- а первого физиологического сужения;
- б кардиального отдела ;
- в средней трети пищевода;
- г нижней трети пищевода ;
- д верхней трети пищевода .

429. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ РЕЛАКСАЦИИ КУПОЛА ДИАФРАГМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- а низкое стояние купола диафрагмы на больной стороне
- б парадоксальное движение диафрагмы на рентгеноскопии
- в снижение прозрачности легочных полей
- г смещение средостения в здоровую сторону

430 ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМАМИ

- а срыгивания молоком с рождения
- б рвота створоженным молоком с 3-4 недель
- в "мокрой подушки"
- г рвотой в горизонтальном положении
- д запорами
- е олигоурией

Укажите все правильные ответы

431. ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС ДИАГНОСТИРУЕТСЯ МЕТОДАМИ

- а УЗИ внутренних органов

- б** фиброгастроскопии
- в** рентгенографии контрастной
- г** рентгенографии в положении Тренделенбурга
- д** ирригографии
- е** компьютерной томографии

432. ВЫДЕЛИТЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОМ УЗИ-ОБСЛЕДОВАНИИ

- а** многоводие
- б** маловодие
- в** микрогастрия
- г** гипоплазия легких
- д** отсутствие визуализации пищевода

Укажите все правильные ответы

433. ВЕДУЩИМИ ПРИЗНАКАМИ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЮТСЯ

- а** вздутие живота и рвота неизмененным молоком
- б** пенистое отделяемое из ротовой полости, невозможность проведения зонда в желудок
- в** разлитой цианоз, множественные хрипы при аускультации
- г** запавший живот и рвота створоженным молоком
- д** рвота молоком с прожилками крови, потеря в весе

Укажите все правильные ответы

434. ОСЛОЖНЕНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНОГО РЕФЛЮКСА СО СТОРОНЫ ПИЩЕВОДА МОГУТ БЫТЬ

- а** метаплазия эпителия
- б** эзофагит
- в** пептический стеноз
- г** кровотечение из вен пищевода

д перфорация пищевода

Особенности травматологии. Повреждения костей конечностей.

Укажите правильный ответ

435. В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРЕОБЛАДАЕТ ТРАВМАТИЗМ

- а бытовой;
- б уличный;
- в школьный;
- г спортивный;
- д прочий.

436. В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРЕОБЛАДАЕТ БЫТОВОЙ ТРАВМАТИЗМ

- а повреждения;
- б ожоги;
- в инородные тела;
- г отравления;
- д огнестрельные повреждения.

Укажите все правильные ответы

437. К РОДОВОЙ ТРАВМЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОТНОСИТСЯ

- а вывих бедра
- б ложный сустав ключицы
- в перелом ключицы
- г эпифизеолиз дистального отдела плечевой кости
- д эпифизеолиз дистального отдела бедренной кости
- е вывих плечевой кости

Укажите правильный ответ

438. РОДОВОЙ ПЕРЕЛОМ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ТРЕБУЕТ

- а фиксация ручки к туловищу ребенка;
- б лейкопластырное вытяжение;
- в гипсовая повязка;
- г повязка Дезо;
- д торакобрахильная гипсовая повязка с отведением плеча (90°) и сгибанием предплечья в локтевом суставе (90°).

Укажите все правильные ответы

439. ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕЛОМЫ

- а** перелом коллеса
- б** перелом смита
- в** поднадкостничный перелом
- г** апофизеолиз внутреннего надмыщелка плечевой кости
- д** перелом беннета
- е** перелом по типу зеленой веточки

440. ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ СОПОСТАВЛЕННЫХ ОТЛОМКОВ ПОСЛЕ ЗАКРЫТОЙ РЕПОЗИЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- а** циркулярная гипсовая повязка с фиксацией ближайшего сустава
- б** гипсовая лонгета с фиксацией двух близлежащих суставов

441. ПРИ НАРАСТАНИИ ОТЕКА В МЕСТЕ ПЕРЕЛОМА НА 2-Е СУТКИ ПОСЛЕ РЕПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО

- а** разрезать бинт и разжать гипс
- б** разрезать бинт и снять гипс
- в** понаблюдать

Укажите все правильные ответы

442. ТОЛЬКО В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ

- а** поднадкостничный перелом
- б** апофизеолиз
- в** вывих головки бедренной кости
- г** подвывих головки лучевой кости
- д** эпифизеолиз и остеэпифизеолиз
- е** перелом шейки бедренной кости

443. ДЛЯ ПОДНАДКОСТНИЧНОГО ПЕРЕЛОМА ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ

- а** боль
- б** патологическая подвижность
- в** крепитация
- г** потеря функции
- д** деформация
- е** отек мягких тканей

444 КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЮТСЯ

- а** нарушение функции
- б** выраженность сосудистого рисунка
- в** патологическая подвижность
- г** флюктуация
- д** локальная боль
- е** деформация
- ж** крепитация

445. ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ "СВЕЖИХ" ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- а** гипсовую лонгету с фиксацией двух соседних суставов
- б** гипсовую лонгету с фиксацией одного сустава
- в** циркулярную гипсовую повязку
- г** липкопластырное или скелетное вытяжение
- д** шину Томаса
- е** торакобрахиальную гипсовую повязку по Уитмен-Громову

Укажите правильный ответ

446. ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ У РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА ЛЕЧИТСЯ

- а** повязка Дезо;
- б** торакобрахиальная повязка;
- в** шино-гипсовая 8-образная повязка;
- г** костыльно-гипсовая повязка по Кузьминскому – Карпенко;
- д** фиксация не требуется.

457. КОНТРОЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК В ГИПСЕ ПОСЛЕ РЕПОЗИЦИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- а** на 2-е сутки;
- б** на 3-5-е сутки;
- в** на 6-7-е сутки;
- г** на 10-14-е сутки;
- д** рентгенологический контроль не обязателен.

458. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ В

- а** шейном отделе;
- б** верхне-грудном отделе;
- в** средне-грудном отделе;
- г** нижне-грудном отделе;

д поясничном отделе.

459. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КОМПРЕССИОННОМ ПЕРЕЛОМЕ ПОЗВОНОЧНИКА В СРЕДНЕГРУДНОМ ОТДЕЛЕ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ НАБЛЮДАЕТСЯ

- а локальная болезненность, деформация;
- б болезненность при осевой нагрузке;
- в** локальная болезненность, затрудненное дыхание;
- г болезненность при осевой нагрузке, неврологическая симптоматика;
- д нарушение функции тазовых органов.

Андрология.

Патология вагинального отростка брюшины

Укажите правильный ответ

460. ПРИЧИНОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ:

- а. Слабость передней стенки пахового канала
- б. Расширение наружного кольца пахового канала
- в. Незаращение вагинального отростка брюшины**
- г. Высокое внутрибрюшное давление
- д. Дефект внутреннего кольца пахового канала

461. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ДЛЯ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- а тошнота и рвота;
- б подъем температуры;
- в эластическое выпячивание в паховой области;**
- г боли в животе;
- д плохой аппетит.

462. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ПАХОВО-МОШОНОЧНОЙ ГРЫЖИ ЧАЩЕ ПРИХОДИТСЯ ПРОВОДИТЬ С:

- а орхитом;**

- б** водянкой оболочек яичка;
- в** варикоцеле;
- г** перекрутом гидатиды;
- д** орхоэпидидимитом.

463. СООБЩАЮЩАЯСЯ ВОДЯНКА ОБОЛОЧЕК ЯИЧКА У БОЛЬНОГО 1.5 ЛЕТ ОБУСЛОВЛЕНА:

- а** повышенным внутрибрюшным давлением;
- б** ангиодисплазией;
- в** травмой пахово-мошоночной области;
- г** незаращением вагинального отростка;
- д** инфекцией мочевыводящих путей.

464. ДЛЯ ОСТРО ВОЗНИКШЕЙ ВОДЯНКИ ОБОЛОЧЕК ЯИЧКА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

- а** появление припухлости в одной половине мошонки;
- б** ухудшение общего состояния;
- в** подъем температуры;
- г** резкая болезненность;
- д** гиперемия мошонки.

465. ПОЛНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО ОТРОСТКА БРЮШИНЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ К:

- а** 28-32-й неделям внутриутробной жизни;
- б** рождению;
- в** 1-му году;
- г** 2-3-м годам;
- д** сразу после рождения.

466. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КИСТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СЕМЕННОГО КАНАТИКА ЯВЛЯЕТСЯ:

- а** гормональный дисбаланс;
- б** ангиодисплазия;
- в** незаращение вагинального отростка брюшины;
- г** специфический процесс;
- д** патология мочевыделительной системы.

467. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- а порок развития сосудов пуповины;
- б** незаращение апоневроза пупочного кольца;
- в воспаление пупочных сосудов;
- г портальная гипертензия;
- д родовая травма.

468. У РЕБЕНКА ОДНОГО ГОДА С ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

- а экстренное оперативное вмешательство;
- б операцию в плановом порядке по достижении 2 лет;
- в** наблюдение в динамике, ЛФК
- г массаж живота, профилактику запоров;
- д стягивание краев пупочного кольца лейкопластырем.

469. ПРИ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕ, НЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ НАРУШЕНИЙ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА, ОПЕРИРОВАТЬ СЛЕДУЕТ:

- а по установлении диагноза;
- б до 1 года;
- в до 2 лет;
- г после 3 лет;
- д в 4-5 лет.

470 ПАХОВАЯ ГРЫЖА У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ СВЯЗАНА С

- а** необлитерированным вагинальным отростком брюшины
- б гиперпродукцией водяночной жидкости
- в нарушением лимфооттока
- г слабостью передней брюшной стенки
- д повышенной физической нагрузкой

Укажите все правильные ответы

471 НЕОСЛОЖНЕННАЯ ПАХОВО-МОШОНОЧНАЯ ГРЫЖА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- а** урчанием при вправлении
- б безболезненное невосприимчивое в брюшную полость образование
- в диафаноскопия, симптом просвечивания

- г наружное паховое кольцо расширено
- д симптом "кашлевого" толка положителен

**472 НЕОСЛОЖНЕННАЯ ВОДЯНКА ОБОЛОЧЕК ЯИЧКА
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- а урчанием при вправлении
- б образование не вправляется**
- в диафаноскопия, симптом просвечивания
- г наружное паховое кольцо расширено
- д симптом "кашлевого" толка положителен

**473 ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ
УЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ И ОСТРО ВОЗНИКШЕЙ
КИСТОЙ СЕМЕННОГО КАНАТИКА ПОКАЗАНЫ**

- а диафаноскопия
- б бимануальная пальпация области
внутреннего пахового кольца**
- в обзорный снимок брюшной полости
- г пальпация наружного пахового кольца
- д УЗИ

**474 ПРИ УЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ У ДЕТЕЙ
ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОКАЗАНА**

- а во всех случаях
- б у девочек во всех случаях**
- в у мальчиков если консервативно не вправляется в первые часы
- г при давности ущемления более 12 часов
- д если давность не установлена

Дополнить

**475 ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ _____**

Ответ: операция

Гипоспадия.

Укажите правильный ответ

476. ГИПОСПАДИЯ – ЭТО:

- а. Искривление полового члена
- б. порок развития уретры**
- в. Аномальное расположение меатуса

- г. Расщепление крайней плоти
- д. Сочетание всех признаков

477. СРОЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГИПОСПАДИИ ТРЕБУЕТ УСТРАНЕНИЕ

- а. Искривление полового члена
- б. Меатостеноз**
- в. Аномальное расположение меатуса
- г. Расщепление крайней плоти
- д. Сочетание всех признаков

478. ОПТИМАЛЬНЫМ ВОЗРАСТОМ ДЛЯ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПО ПОВОДУ ДИСТАЛЬНОЙ ГИПОСПАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ :

- а новорожденные и грудные дети;
- б 6 мес. - 1 год ;
- в 1-2 года ;**
- г 5-6 лет ;
- д 7-10 лет.

479. ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ЛЕЧЕНИЯ МЕАТАЛЬНОГО СТЕНОЗА ПРИ ГИПОСПАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- а 1-2 года;
- б 3-5 лет ;
- в 6-8 лет ;
- г по установлении диагноза;**
- д в пубертатном периоде .

Крипторхизм.

Укажите все правильные ответы

480 ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЯИЧКА ПРИ КРИПТОРХИЗМЕ

- а паховая**
- б лобковая**
- в бедренная**
- г промежностная**
- д перекрестная**

е брюшная

481 ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЯИЧКА ПРИ ЭКТОПИИ

- а паховая
- б лобковая
- в бедренная
- г промежностная
- д перекрестная
- е брюшная

482. НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ФОРМА КРИПТОРХИЗМА:

- а пениальная
- б бедренная
- в промежностная
- г перекрестная
- д пупочная.

483. ОПТИМАЛЬНЫМ ВОЗРАСТОМ НАЧАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРИПТОРХИЗМА СЧИТАЮТ:

- а период новорожденности;
- б 6 мес - 1 год;
- в 2-5 лет;
- г 6-9 лет;
- д начиная с 10 лет.

484. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ КРИПТОРХИЗМ:

- а в форме эктопии;
- б двусторонняя форма
- в ретенция яичка после пахового грыжесечения
- г наступившая пубертатность;
- д крипторхизм в сочетании с грыжей.

Синдром отечной мошонки.

485. КАКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕКРУТА ГИДАТИДЫ ЯИЧКА:

- а подострое начало заболевания;

б темное образование определяется в мошонке при диафаноскопии;
в наличие выпота в оболочках яичка;
г пальпируется болезненное округлое образование на яичке;
д тяжелая интоксикация и лихорадка.

486. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМОЕ ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЯИЧЕК:

- а перекрут гидатиды яичка;
- б перекрут яичка;
- в орхоэпидидимит;
- г флегмона Фурнье;
- д травматический разрыв яичка .

487. ГИПЕРЕМИЯ, СТЕКЛОВИДНЫЙ ОТЕК ТКАНЕЙ МОШОНКИ С БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- а перекрут яичка
- б аллергический отек мошонки;
- в орхит
- г некроз гидатиды яичка
- д остро возникшая водянка оболочек яичка

Варикоцеле.

Укажите правильный ответ

488 ВАРИКОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ ВОЗНИКАЕТ

- а до 3-х лет
- б до 9-10 лет
- в после 9-10 лет

Укажите все правильные ответы

489. ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ВАРИКОЦЕЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- а возможно тянущие боли в области мошонки
- б “кинжальные” боли в области мошонки
- в пучок расширенных вен в мошонке
- г кистозное образование в мошонке
- д солидное образование мошонки
- е отсутствие жалоб

490. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВАРИКОЦЕЛЕ НЕОБХОДИМО

- а** регулярные профилактические осмотры
- б** эходоплерография мошонки
- в** УЗИ забрюшинного пространства
- г** диафаноскопия мошонки
- д** КТ, МРТ
- е** пробу Абелева-Татарина

Дополнить

491. НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ-----

Ответ: бесплодием

Пороки верхних мочевых путей.

492.ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ГИДРОНЕФРОЗА СЧИТАЮТ:

- а** наличие обструкции в прилоханочном отделе мочеточника;
- б** нарушение сократительной способности лоханки;
- в** рецидивирующий пиелонефрит;
- г** истончение почечной паренхимы ;
- д** снижение почечного кровотока.

Укажите все правильные ответы

493. ПРИЧИНЫ ОБСТРУКЦИИ МОЧЕТОЧНИКА ПРИ ГИДРОНЕФРОЗЕ:

- а** аберрантный сосуд
- б** стеноз мочеточника в прилоханочном отделе
- в** стеноз в дистальном отделе мочеточника
- г** клапан мочеточника в области лоханочно-мочеточникового сегмента
- д** высокое отхождение мочеточника

494. ФОРМЫ МЕГАУРЕТЕРА:

- а** рефлюксирующий
- б** изолированный
- в** нерефлюксирующий
- г** нетипичный

Укажите правильный ответ

495. МУЛЬТИКИСТОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ ЭТО

- а** замещение участка почки многокамерной кистой не сообщающейся с лоханкой
- б** одна почка замещена кистозными полостями полностью
- в** одиночное кистозное образование в паренхиме почки
- г** две почки замещены кистозными полостями

Укажите правильные ответы

496 ДЛЯ ОБСТРУКТИВНОГО ГИДРОНЕФРОЗА ХАРАКТЕРНЫ

- а** боль
- б** изменения в анализах мочи
- в** симптом пальпируемой опухоли
- г** гематурия
- д** дизурия
- е** повышение артериального давления
- ж** изменение биохимии крови

497 ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ ГИДРОНЕФРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- а** ультразвуковое сканирование
- б** экскреторная урография
- в** цистография
- г** радионуклидное исследование
- д** КТ
- е** почечная ангиография

Укажите правильный ответ

498. ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ВРОЖДЕННОГО ГИДРОНЕФРОЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- а** с-м пальпируемой опухоли
- б** пиурия
- в** протеинурия
- г** почечная недостаточность
- д** боль

499 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГИДРОНЕФРОЗ РЕБЕНКУ 7 ДНЕЙ ПОКАЗАНО

- а** УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря
- б** внутривенная урография

- в цистография
- г ангиография

Укажите все правильные ответы

500 . РАСШИРЕНИЕ ЛОХАНКИ ПОЧКИ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОМ УЗИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ

- а** гидронефротической трансформации почки
- б** уретерогидронефроза
- в** мультикистозной трансформации почки
- г** пузырно-мочеточникового рефлюкса
- д** удвоения почки

Инфравезикальная обструкция.

Укажите правильный ответ

501. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ПРИЧИНАМ ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- а** гипертрофия семенного бугорка;
- б** клапан задней уретры
- в** полип уретры;
- г** меатостеноз
- д** склерозом шейки мочевого пузыря.

502. АКТИВНЫЙ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ РЕФЛЮКС МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕН ПРИ

- а** при цистоскопии;
- б** при антеградной урографии;
- в** при микционной цистоуретрографии;
- г** при урофлоуметрии;
- д** при цистометрии.

503. ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕФЛЕКСИРУЮЩЕГО МЕГАУРЕТЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

- а** незрелость нервно-мышечных структур стенки мочеточника
- б** стеноз устья мочеточника
- в** пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- г** несостоятельность клапанного механизма устья мочеточника
- д** короткий интрамуральный отдел мочеточника
- е** дистопия устья мочеточника

**504 ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕРЕФЛЮКСИРУЮЩЕГО
МЕГАУРЕТЕРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- а** незрелость нервно-мышечных структур стенки мочеточника
- б** стеноз устья мочеточника
- в** пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- г** несостоятельность клапанного механизма устья мочеточника
- д** короткий интрамуральный отдел мочеточника
- е** дистопия устья мочеточника