

Жалобы на боли в спине после падения с высоты

Укажите все правильные ответы

1. Боли в спине, задержка дыхания после падения с высоты могут наблюдаться при

- а) компрессионном переломе тела позвонка
- б) ушибе спины
- в) черепно-мозговой травме
- г) переломе бедра
- д) сколиозе
- е) травме почки
- ж) болезни Шейерман –Мау
- з) болезни Кальве

2. Локальная боль при пальпации остистых отростков позвонков после травмы является основным симптомом при

- а) компрессионном переломе тела позвонка
- б) ушибе спины
- в) черепно-мозговой травме
- г) переломе бедра
- д) сколиозе
- е) травме почки
- ж) болезни Шейерман –Мау
- з) болезни Кальве

3. При травме спины показано обследование:

- а) Рентгенография позвоночника в двух проекциях.
- б) УЗИ
- в) Теплография
- г) Радиоизотопное исследование
- д) Миография

Укажите правильный ответ

4. На спондилограмме клиновидное уменьшение высоты тел позвонков у ребенка с травмой указывает на



- а) Компрессионный перелом тела позвонка
- б) Ушиб спины
- в) Черепно-мозговую травму
- г) Перелом бедра
- д) сколиоз
- е) травму почки
- ж) болезнь Шейерман –Мау
- з) болезнь Кальве

5. Каким образом должен транспортироваться пациент с подозрением на компрессионный перелом позвоночника:

- а) в специализированных шинах
- б) на жесткой поверхности лежа
- в) сидя в специализированном кресле.

6. При травме позвоночника показано

- а) стационарное обследование и лечение
- б) амбулаторное обследование и лечение
- в) наблюдение

Ответы:

1. а, б. 2 а,б. 3 а, г. 4 а. 5 б. 6 а