

Жалобы на наличие образования в пахово-мошоночной области безболезненного мягко-эластической консистенции у мальчика 1 месяца.

Укажите все правильные ответы

1. Наличие опухолевидного образования в пахово-мошоночной области характерно для:

- а) пахово-мошоночной грыжи
- б) варикоцеле
- в) крипторхизма
- г) водянки оболочек яичек
- д) лимфаденита

Укажите правильный ответ

2. Наличие в мошоночной области, за пределами наружного пахового кольца безболезненного, образования плотно-эластической консистенции, не вправимого в брюшную полость, с характерным симптомом «просвечивания» при диафаноскопии, характерно для

- а) пахово-мошоночной грыжи
- б) кисты семенного канатика
- в) водянки оболочек яичек
- г) крипторхизма, паховая форма
- д) лимфаденита



3. Наличие в пахово-мошоночной области образования эластичной консистенции, легко с урчанием вправимого в брюшную полость, характерно для

- а) пахово-мошоночной грыжи
- б) кисты семенного канатика
- в) водянки оболочек яичек
- г) крипторхизма
- д) лимфаденита



4. Наличие в паховой области плотно-эластического, б/болезненного, невправимого в брюшную полость образования, характерно для

- а) пахово-мошоночной грыжи
- б) кисты семенного канатика
- в) водянки оболочек яичка
- г) крипторхизма
- д) лимфаденита



5. Наличие ниже паховой связки округлого, болезненного при пальпации образования, с гиперемией кожи, подъемом температуры, характерно для:

- а) пахово-мошоночной грыжи
- б) кисты семенного канатика
- в) водянки оболочек яичек
- г) крипторхизма
- д) лимфаденита

6. Наличие в паховой области образования плотноэластичной консистенции, малоподвижного, б/болезненного при пальпации, при отсутствии яичка в мошонке характерно для:

- а) пахово-мошоночной грыжи
- б) кисты семенного канатика
- в) водянки оболочек яичка
- г) крипторхизма, паховой формы
- д) лимфаденита



Дополнить

7. При сложности дифференциальной диагностики объемного образования в паховой области показано выполнить -----

Укажите все правильные ответы

8. При подозрении на пахово-мошоночную грыжу необходимо обследование:

- а) УЗИ мошонки и паховой области
- б) рентгенографию
- в) диафаноскопия
- г) проба Вальсальвы
- д) пневмоирригация

Укажите правильный ответ

9. Симптом “Просвечивания” на диафаноскопии характерен для

- а) пахово-мошоночной грыжи
- б) кисты семенного канатика
- в) водянки оболочек яичек
- г) крипторхизма
- д) лимфаденита

10. При выявлении неосложненной пахово-мошоночной грыжи необходимо:

- а) оперативное лечение в плановом порядке у детей старше 6 месяцев
- б) оперативное лечение в экстренном порядке
- в) консервативное лечение
- г) ношение бандажа

11. При водянке оболочек яичек необходимо:

- а) оперативное лечение в плановом порядке у детей старше 6 месяцев
- б) оперативное лечение в экстренном порядке
- в) консервативное лечение
- г) ношение бандажа
- д) оперативное лечение в плановом порядке у детей старше 2 лет

12. При ущемленной пахово-мошоночной грыже у мальчиков показано:

- а) экстренная госпитализация с экстренным оперативным вмешательством
- б) оперативное лечение в плановом порядке.
- в) ношение бандажа

13. При ущемленной паховой грыже у девочек показано:

- а) оперативное лечение в экстренном порядке

- б) оперативное лечение в плановом порядке.
- в) наблюдение в динамике.

Ответы:

**1 а, г. 2 в. 3 а. 4 б. 5 д. 6 г. 7 УЗИ. 8 а, в. 9 в. 10 а. 11 д.
12 а. 13 а.**