

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БОЛЬНИЦЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. **Детская больница лечебно-диагностическое учреждение для детей в возрасте включительно до (возраст в годах)**
- 15
 - 16
 - 17
 - 18

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

2. **К детским лечебно-профилактическим учреждениям относятся**
- детская больница
 - детская поликлиника
 - ясли – детский сад
 - детский санаторий
3. **В число основных подразделений больницы входят**
- приёмное отделение
 - станция скорой помощи
 - лечебные отделения
 - лечебно-диагностические кабинеты, лаборатории
 - диспансер
4. **В число основных помещений приёмного отделения входят**
- регистратура
 - вестибюль-ожидальня
 - приёмно-смотровые боксы
 - санитарный пропускник
 - реанимационное отделение
5. **Задачами приёмного отделения являются**
- приём и регистрация больного
 - консультативный амбулаторный приём больных
 - направление больных в лечебные отделения больницы;
 - санитарная обработка больных
 - наблюдение за больными, выписанными из больницы
 - предупреждение заноса инфекционных заболеваний
6. **В обязанности медицинской сестры приёмного покоя входит**
- заполнение паспортной части истории болезни
 - заполнение листа анамнеза
 - измерение температуры тела
 - назначение необходимой лечебной помощи больному
 - осмотр на педикулёз
7. **Документы, представляемые для госпитализации больного**
- направление на госпитализацию
 - свидетельство о рождении
 - сведения о контактах с инфекционными больными
 - страховой полис

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

8. **Вид санитарной обработки больного в приёмном отделении определяет**
- врач
 - медицинская сестра
 - санитарка
9. **Больные в приёмном отделении не должны задерживаться более**
- 15 минут
 - 30 минут
 - 1 часа
10. **Вид транспортировки больного из приемного покоя выбирает**
- санитарка
 - медицинская сестра
 - врач
11. **Больные в удовлетворительном состоянии транспортируются в лечебное отделение**
- на кресле-каталке
 - идут самостоятельно
 - идут самостоятельно в сопровождении медицинского работника
12. **Тяжелобольных детей транспортируют**
- на носилках-каталках
 - на руках
 - идут самостоятельно
13. **Детей раннего возраста транспортируют**
- на носилках-каталках
 - на руках или на кресле-каталке
 - идут самостоятельно в сопровождении медицинского работника

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

14. **Укажите последовательность действий при приёме больного в больницу**
- санитарная обработка
 - врачебный осмотр
 - регистрация
 - транспортировка в лечебное отделение
 - необходимая лечебная помощь
15. **Больного, поступающего в крайне тяжёлом состоянии, направляют**
- в приёмное отделение
 - в реанимационное отделение
 - в лечебное отделение больницы
 - после санитарной обработки
 - без санитарной обработки

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

16. В целях предупреждения заноса инфекционных заболеваний в стационар детской больницы в приёмном покое необходимо обеспечить

- а) сведения о контакте ребёнка с инфекционными больными
- б) наличие приёмно-смотровых боксов
- в) сведения о прививках
- г) тщательный осмотр кожи и зева ребёнка
- д) соблюдение санитарно-гигиенического режима
- е) исключение встречных потоков больных

17. Сотрудник справочной (информационной) службы при приёмном покое может сообщить родителям по телефону

- а) тяжесть состояния ребёнка
- б) диагноз
- в) сведения о лечении
- г) температуру тела

18. К организационным принципам работы стационара детской больницы относят

- а) создание лечебно-охранительного режима
- б) создание санитарно-противоэпидемического режима
- в) организация неотложной помощи на дому
- г) лечебно-диагностические мероприятия
- д) учебно-воспитательная работа с детьми

19. В число элементов распорядка дня детей, находящихся в лечебном отделении больницы, входят

- а) лечебно-диагностические процедуры
- б) физическая зарядка
- в) врачебный обход
- г) приём пищи
- д) режим сна, отдыха, прогулок
- е) общественно-полезный труд

20. В лечебном отделении выделяют следующие типы боксов

- а) открытые
- б) закрытые
- в) совмещённые
- г) сообщающиеся
- д) полные (мельцеровские)
- е) неполные (полубоксы)

21. Палата лечебного отделения должна иметь

- а) выход во внутренний коридор
- б) выход на улицу
- в) централизованную подачу кислорода
- г) бактерицидную лампу

22. В отличие от палаты в полном (мельцеровском) боксе имеются

- а) выход во внутренний коридор
- б) выход на улицу
- в) санитарный блок
- г) изоляция больного
- д) шлюз для персонала

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

23. Неполный бокс (полубокс) отличается от полного бокса

- а) наличием выхода во внутренний коридор
- б) наличием выхода на улицу
- в) отсутствием выхода во внутренний коридор
- г) отсутствием выхода на улицу
- д) отсутствием окна для подачи пищи

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

24. Распределение детей дошкольного и школьного возраста с неинфекционными заболеваниями в лечебных палатах осуществляется по

- а) возрасту
- б) полу
- в) мере заполнения палаты
- г) строго по диагнозу

25. Распределение детей раннего возраста с неинфекционными заболеваниями в лечебных палатах осуществляется по

- а) возрасту
- б) полу
- в) диагнозу
- г) наличие свободных мест в палате

26. Распределение детей с инфекционными заболеваниями в палатах или боксах осуществляется по

- а) возрасту
- б) полу
- в) однородности диагнозов и срокам заболевания и поступления

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

27. Дезинсекция – это система мероприятий по уничтожению

- а) бактерий
- б) грибов
- в) вшей
- г) клещей
- д) вирусов
- е) блох

28. Первичный осмотр больного на педикулёз проводится при его поступлении

- а) в лечебное отделение
- б) в приёмный покой
- в) дежурным врачом
- г) медицинской сестрой
- д) санитаркой

29. Педикулёз передаётся

- а) при использовании белья и одежды больного
- б) при отдалённом контакте детей в палате
- в) при непосредственном контакте детей в палате
- г) при использовании общих предметов гигиены

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

30. Для обработки волосистой части головы при педикулёзе используют

- а) дезинфицирующие растворы (хлорсодержащие)
- б) гигиенический шампунь
- в) инсектицидные препараты
- г) дегтярное мыло

31. Время экспозиции при обработке волосистой части головы лосьоном «Ниттифор» составляет

- а) 20 минут
- б) 30 минут
- в) 40 минут
- г) 50 минут
- д) 60 минут

32. После обработки волосистой части головы инсектицидным раствором голову следует вымыть горячей водой с:

- а) хозяйственным мылом
- б) раствором уксуса
- в) гигиеническим шампунем
- г) чистой водой

33. После первой обработки волосистой части головы инсектицидным раствором при педикулёзе процедуру повторяют через

- а) 3 дня
- б) 7-10 дней
- в) 10-15 дней
- г) 30 дней

34. Для удаления гнид волосы обрабатывают ватой, смоченной

- а) раствором хозяйственного мыла
- б) 8% раствором подогретого столового уксуса
- в) 0,5 % раствором хлорамина
- г) раствором дегтярного мыла

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

35. Санитарно-противоэпидемический режим в стационарах детских больниц включает соблюдение

- а) санитарного режима отделений
- б) лечебно-охранительного режима
- в) личной гигиены персонала
- г) личной гигиены больных детей
- д) режима сна, прогулок, занятий детей
- е) режима изоляции больных с инфекционными заболеваниями

36. Санитарно-гигиенические требования в лечебном отделении включают

- а) личную гигиену больных и персонала
- б) проведение лечебно-диагностических мероприятий
- в) ежедневную профилактическую дезинфекцию
- г) режим уборки и проветривания палат и других помещений

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

37. Дезинфекция – это система мероприятий по уничтожению

- а) насекомых
- б) возбудителей заболеваний (вирусов, бактерий, грибов)
- в) грызунов

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

38. Различают следующие виды дезинфекции

- а) профилактическая
- б) лечебная
- в) очаговая (в эпид. очаге)
- г) начальная
- д) текущая
- е) заключительная

39. Профилактическая дезинфекция отличается от очаговой тем, что проводится

- а) во всех отделениях больницы
- б) в эпидемическом очаге
- в) постоянно, независимо от наличия инфекционных заболеваний
- г) при возникновении инфекционных заболеваний

40. Текущая дезинфекция проводится

- а) во всех отделениях больницы
- б) в эпидемическом очаге
- в) для снижения инфицированности среды вокруг инфекционного больного
- г) для предупреждения накопления возбудителей заболеваний

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

41. Заключительную дезинфекцию проводят для

- а) предупреждения накопления возбудителей заболеваний
- б) снижения инфицированности среды вокруг инфекционного больного
- в) полной ликвидации возбудителей заболеваний

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

42. Способы проведения дезинфекции делятся на

- а) механические
- б) физические
- в) химические
- г) биологические

43. К механическим способам дезинфекции относятся

- а) стирка белья
- б) кипячение белья
- в) обработка водяным паром
- г) мытьё рук
- д) удаление пыли и грязи влажной тряпкой
- е) замачивание белья и посуды в дезинфицирующих растворах

44. К физическим способам дезинфекции относятся

- а) замачивание белья и посуды в дезинфицирующих растворах
- б) кипячение белья
- в) удаление пыли и грязи влажной тряпкой
- г) стирка белья
- д) обработка водяным паром (автоклавирование)

45. К химическим способам дезинфекции относятся

- а) мытьё рук с туалетным мылом
- б) мытьё рук с использованием дезинфицирующего раствора
- в) автоклавирование
- г) обработка поверхностей влажной салфеткой
- д) обработка поверхностей влажной салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором

46. К химическим средствам, используемым для дезинфекции в детской больнице, относятся растворы

- а) хлорсодержащие (хлорамин и др.)
- б) мыльно-содовый
- в) растворы уксуса
- г) специализированные растворы для дезинфекции
- д) растворы перекиси водорода

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

47. Профилактическую дезинфекцию и уборку в палатах, коридорах и других помещениях лечебного отделения проводит

- а) медицинская сестра
- б) санитарка
- в) сестра-хозяйка

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

48. Текущая ежедневная уборка в лечебных отделениях включает

- а) мытьё оконных и дверных рам, стёкол
- б) мытьё полов, предметов обстановки
- в) наведение порядка в прикроватных тумбочках, в шкафах на посту
- г) мытьё стен, плафонов
- д) проветривание, кварцевание палат, коридоров

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

49. Генеральную уборку в лечебных отделениях проводят

- а) 2 раза в неделю
- б) 1 раз в 7-10 дней
- в) 1 раз в 2 недели
- г) 1 раз в месяц

50. Предметы уборочного инвентаря (вёдра, салфетки, щётки и др.) используются

- а) для уборки всех помещений лечебного отделения
- б) отдельно для уборки палат, процедурного кабинета, буфета и др. помещений

51. После использования уборочный материал подвергают

- а) стирке в растворе хозяйственного мыла
- б) обработке в автоклаве
- в) замачиванию в дезинфицирующем растворе с нужной экспозицией
- г) кипячению

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

52. Предметы ухода за больными, инструменты, моющиеся игрушки после использования

- а) промывают водой
- б) моют с мылом
- в) погружают в дезинфицирующий раствор, соблюдая время экспозиции

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

53. Полы в палатах, коридорах и других помещениях лечебного отделения

- а) подметают
- б) моют тёплой водой
- в) моют водой с добавлением дезинфицирующего раствора

54. Полы в палатах, коридорах и других помещениях лечебного отделения моют не реже

- а) 1-го раза в день
- б) 2-х раз в день
- в) 3-х раз в день

55. Панели в лечебных отделениях моют

- а) 1 раз в день
- б) 1 раз в 2 дня
- в) 1 раз в 3 дня
- г) 1 раз в неделю

56. В помещениях лечебных отделений обработку поверхностей (стены, двери, столы, тумбочки, кровати и т.д.) проводят

- а) тёплой водой
- б) тёплым мыльным раствором
- в) однократным протиранием ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором
- г) двукратным протиранием ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором

57. Оконные рамы, двери, стёкла, верхние части стен в лечебных отделениях моют

- а) 1 раз в день
- б) 1 раз в 3 дня
- в) 1 раз в 7-10 дней
- г) 1 раз в 14 дней

58. Влажное протирание радиаторов и труб центрального отопления в лечебных палатах проводят

- а) ежедневно
- б) 1 раз в 3 дня
- в) 1 раз в неделю

59. Проветривание палат проводят ежедневно не реже

- а) 1-го раза
- б) 2-х раз
- в) 3-х раз
- г) 4-х раз
- д) 5-ти раз

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

60. Основным способом обеззараживания рук медицинского персонала отделений является их мытьё

- а) туалетным мылом
- б) хозяйственным мылом
- в) антисептическим мылом
- г) однократное
- д) двукратное
- е) трёхкратное

61. Ношение маски является обязательным

- а) во всех отделениях стационара
- б) в отдельных отделениях стационара
- в) во всех отделениях в период эпидемии

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

62. Смена халатов, колпаков медицинского персонала проводится в неделю не реже

- а) 1-го раза
- б) 2-х раз
- в) 3-х раз

63. Маску следует менять

- а) через 2 часа
- б) через 4 часа
- в) через 8 часов
- г) через 12 часов

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА БОЛЬНОГО ВЗРОСЛОГО И РЕБЁНКА

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

64. Расстояние между кроватями в палате должно составлять не менее

- а) 1 м
- б) 1,5 м
- в) 2 м
- г) 3 м

65. Гигиеническая ванна детям в лечебном отделении проводится 1 раз в

- а) день
- б) 3-5 дней
- в) 5-7 дней
- г) 7-10 дней
- д) 10-14 дней

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

66. Перед купанием ребёнка ванну следует

- а) вымыть щёткой с мылом
- б) двукратно протереть салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором,
- в) ополоснуть водой

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

67. Смена нательного белья у больных проводится по мере загрязнения, но не реже

- а) 1 раза в 3 дня
- б) 1 раза в 7 дней
- в) 1 раза в 10 дней
- г) 1 раза в 14 дней

68. Смена постельного белья у больных проводится по мере загрязнения, но не реже

- а) 1 раза в 3 дня
- б) 1 раза в 7 дней
- в) 1 раза в 10 дней
- г) 1 раза в 14 дней

69. Смена постельного белья у детей проводится:

- а) самим ребёнком
- б) санитаркой
- в) постовой медицинской сестрой
- г) врачом

70. Родители, родственники, студенты у постели больного ребёнка должны садиться на

- а) кровать пациента
- б) стулья
- в) соседнюю кровать

71. Постель больного перестилают по мере надобности, но не менее

- а) 1 раза в день
- б) 2-х раз в день
- в) 3-х раз в день

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

72. Постель тяжелобольному ребёнку перестилает

- а) сестра-хозяйка
- б) санитарка
- в) постовая медицинская сестра
- г) врач

73. Кровать для детей раннего возраста отличается от кровати для старших детей

- а) меньшими размерами
- б) наличием подвижных секций
- в) наличием съёмных боковых решёток
- г) наличием надкроватного столика
- д) наличием корзины для горшка

74. Функциональная кровать отличается от обычной

- а) отсутствием подвижных секций
- б) наличием подвижных секций
- в) отсутствием надкроватного столика
- г) наличием надкроватного столика
- д) отсутствием корзины для горшка или судна

75. В прикроватной тумбочке разрешается хранить

- а) предметы личной гигиены
- б) сменное бельё
- в) продукты питания
- г) книги, игрушки
- д) уличную обувь

76. За гигиеническое состояние прикроватной тумбочки отвечает

- а) лечащий врач
- б) постовая медицинская сестра
- в) санитарка
- г) сестра-хозяйка

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

77. Укажите порядок смены нательного белья у тяжелобольного ребёнка, сначала освобождают

- а) голову
- б) руки
- в) туловище

78. Укажите порядок смены нательного белья у тяжелобольного ребёнка, сначала чистое бельё надевают на

- а) голову
- б) руки
- в) туловище

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

79. После смены постельного белья пол в палате

- а) подметают
- б) протирают влажной тряпкой
- в) протирают влажной тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе
- г) можно не обрабатывать

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

80. Контроль за ежедневным туалетом (уход за кожей, волосами и т.д.) и помощь детям осуществляет

- а) лечащий врач
- б) постовая медицинская сестра
- в) санитарка
- г) сестра-хозяйка

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

81. Подачу судна, горшка для тяжелобольного ребёнка и их дезинфекцию осуществляет

- а) лечащий врач
- б) медицинская сестра
- в) санитарка
- г) сестра-хозяйка

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

82. Укажите порядок обработки судна или горшка после использования ребенком

- а) промыть холодной водой
- б) обработать дез.р-ром
- в) слить содержимое в канализацию
- г) промыть горячей водой с хозяйственным мылом

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

83. Пролежень – это

- а) гнойное воспаление кожи и подкожной клетчатки
- б) грибковое поражение кожи
- в) некроз мягких тканей в местах сдавления
- г) аллергическое поражение кожи

84. Первым симптомом пролежня является

- а) гиперемия кожи
- б) очаг побледнения кожи
- в) отёк кожи

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

85. Укажите порядок появления симптомов пролежня

- а) отслаивание эпидермиса
- б) очаг побледнения кожи
- в) отёк кожи
- г) гиперемия кожи

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

86. У больных при длительном постельном режиме для профилактики пролежней необходимо

- а) часто перестилать постель, устраняя складки
- б) часто купать ребёнка
- в) обтирать тело мягкой тканью, смоченной полуспиртовым раствором
- г) растирать кожу сухим мягким полотенцем

87. Полоскание полости рта у больных детей раннего возраста проводится

- а) в положении лёжа, повернув голову набок
- б) в положении сидя
- в) из резинового баллона
- г) из поильника
- д) со сменой положения головы на один и другой бок

88. Ежедневный уход за полостью рта ребёнка включает следующие процедуры

- а) чистка зубов щёткой с детской зубной пастой
- б) полоскание полости рта тёплой водой после приёма пищи
- в) протирание слизистой ротовой полости 2% раствором питьевой соды

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

89. Ежедневный уход за глазами включает

- а) умывание лица водой из-под крана во время утреннего и вечернего туалета
- б) умывание кипячёной водой
- в) промывание глаз слабым раствором антисептика
- г) ухода не требуется

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

90. Гигиенический туалет ушей включает следующие процедуры

- а) ежедневное мытьё ушей водой при умывании
- б) ежедневное удаление серных пробок
- в) периодическое очищение наружного слухового прохода ватной турундой

91. Для размягчения и удаления серной пробки в ухо закапывают

- а) физиологический раствор
- б) кипячёную воду
- в) 3% раствор перекиси водорода
- г) стерильное вазелиновое масло

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

92. Удаление корочек из полости носа проводят ватным жгутиком, смоченным

- а) физиологическим раствором
- б) стерильным вазелиновым маслом
- в) полуспиртовым раствором

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

93. Ножницы для стрижки ногтей при уходе за детьми должны быть

- а) с острыми краями
- б) с закруглёнными краями
- в) обработаны перед использованием спиртом
- г) обработаны перед использованием путём кипячения
- д) после использования замочены в дезинфицирующем растворе

94. Родители могут передать ребёнку, находящемуся в больнице

- а) фрукты, ягоды
- б) кисломолочные продукты
- в) соки промышленного изготовления
- г) соки и компоты домашнего приготовления
- д) печенье, вафли, зефир
- е) книги, игрушки

95. Больному ребёнку запрещается передавать

- а) шоколад
- б) фрукты
- в) молоко и молочные продукты
- г) пирожные
- д) печенье
- е) книги и игрушки

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

96. Переданные ребёнку фрукты, соки хранятся в

- а) прикроватной тумбочке
- б) специальном шкафу
- в) холодильнике

**ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА.
ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.**

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

97. В обязанности санитарки входит выполнение

- а) влажной уборки помещений
- б) смены нательного и постельного белья
- в) помощь в ежедневном туалете детей (уход за волосами, кожей и т.д.)
- г) раздача лекарств

98. В обязанности санитарки входит

- а) Помощь в ежедневном гигиеническом уходе за детьми
- б) подача судна, мочеприемника, их дезинфекция
- в) раздача лекарств
- г) контроль санитарного состояния палат и их уборка
- д) подготовка детей к инструментальным методам исследования

99. В обязанности медицинской сестры входит

- а) измерение температуры тела больного
- б) ведение медицинской документации
- в) контроль санитарного состояния палат
- г) уход за больными
- д) назначение лекарственных средств больному

100. В обязанности медицинской сестры входит

- а) сбор материалов для анализов
- б) сопровождение и транспортировка детей на исследования
- в) выписка больного за нарушение режима
- г) составление порционных требований на питание больных
- д) ежедневная профилактическая дезинфекция палат и оборудования

101. В обязанности медицинской сестры входит

- а) прием вновь поступивших в отделение детей
- б) ознакомление детей с режимом дня
- в) ознакомление детей с назначенными лекарственными препаратами
- г) сбор материалов для анализов

102. Палатная медицинская сестра должна уметь

- а) кормить ребенка, в том числе через зонд
- б) давать лекарства через рот
- в) транспортировать больного на исследование
- г) проводить переливание крови

103. Палатная медицинская сестра должна уметь

- а) ставить клизмы всех видов
- б) проводить спинномозговую пункцию
- в) проводить подкожные и внутримышечные инъекции
- г) кормить тяжелобольных детей
- д) проводить катетеризацию центральных вен

104. Палатная медицинская сестра должна уметь

- а) оказывать доврачебную неотложную помощь
- б) проводить с детьми лечебную физкультуру
- в) лично участвовать в раздаче пищи
- г) делать массаж
- д) закапывать лекарственные р-ры в глаза, нос, уши

105. Прием ребенка в лечебное отделение осуществляет

- а) врач
- б) постовая медицинская сестра
- в) санитарка
- г) старшая медицинская сестра

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

106. При приеме ребенка в лечебное отделение медицинская сестра должна

- а) отметить время поступления в истории болезни
- б) передать телефонограмму в поликлинику
- в) провести осмотр волосистой части головы и кожи
- г) познакомить ребенка с правилами пребывания в отделении

107. Прием и передача дежурства медицинскими сестрами проводятся

- а) в палате у постели больного (покроватно)
- б) на медицинском сестринском посту
- в) на утренней конференции у старшей мед.сестры
- г) на утренней конференции у зав.отд.

108. Заступающая на дежурство медицинская сестра обязана

- а) провести обход больных совместно со сдающей медицинской сестрой
- б) принять термометры, шприцы, медикаменты, предметы ухода
- в) проверить наличие чистого белья
- г) доставить сведения о движении больных в приемный покой

109. В журнале сдачи дежурств медицинская сестра отмечает

- а) количество израсходованных лекарств за смену
- б) сведения о движении больных (сколько выписано и принято)
- в) количество использованного белья за смену
- г) данные о подготовке больных к лабораторным и инструментальным исследованиям
- д) объем невыполненных назначений у больных

110. В журнале сдачи дежурств отмечают

- а) количество находящихся на посту детей
- б) фамилии и диагнозы вновь поступивших и выписанных больных
- в) лихорадящих и тяжелобольных детей с динамикой их состояния
- г) перечень лекарственных средств и время выдачи их больным
- д) список детей, подготовленных к диагностическим и лечебным процедурам

111. В журнале учета инфекционных больных указывается

- а) ФИО, возраст ребенка
- б) дата выявления инфекционного заболевания, диагноз
- в) температура тела ребенка
- г) масса и рост ребенка
- д) контакты и принятые меры

112. К медицинским документам, с которыми работает палатная медицинская сестра, относятся:

- а) история болезни
- б) требование в аптеку
- в) журнал сдачи дежурств
- г) график дежурств и табель на зарплату
- д) сестринский лист

113. На посту медицинской сестры должны быть

- а) бланки анализов
- б) ящики для хранения историй болезни
- в) шкаф для хранения медикаментов
- г) шкаф для хранения шприцов
- д) сейф для хранения сильнодействующих лекарств

114. Медицинская сестра на титульном листе истории болезни отмечает

- а) время поступления больного в лечебное отделение
- б) результат осмотра больного на педикулез
- в) время раздачи лекарственных препаратов
- г) вид транспортировки больного

115. В листе врачебных назначений медицинская сестра отмечает

- а) время поступления больного в лечебное отделение
- б) результат осмотра больного на педикулез
- в) массу и рост ребенка
- г) время раздачи лекарственных препаратов
- д) выполнение назначенных анализов

116. В температурном листе медицинская сестра отмечает

- а) массу и рост ребенка
- б) время поступления ребенка в отделение
- в) температуру ребенка утром и вечером
- г) дни приема ванн и смены белья
- д) ежедневно стул ребенка

117. Массу ребенка (старше года) следует измерять

- а) при поступлении
- б) каждые 3 – 5 дней
- в) каждые 7 – 10 дней
- г) каждые 12 – 14 дней

118. Массу ребенка первого года жизни следует измерять

- а) при поступлении
- б) ежедневно
- в) каждые 5 дней
- г) каждые 10 дней

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

119. Раздачу лекарственных средств больному осуществляет

- а) врач
- б) палатная медицинская сестра
- в) старшая медицинская сестра
- г) санитарка

120. За соблюдение правил хранения лекарственных средств и их пополнение на сестринском посту отвечает

- а) врач
- б) палатная медицинская сестра
- в) старшая медицинская сестра
- г) санитарка

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

121. В шкафу на сестринском посту лекарственные средства располагаются по следующим группам

- а) стерильные
- б) внутренние
- в) наружные
- г) сильнодействующие

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

122. В сейфе с надписью «А» находятся

- а) ядовитые и наркотические лекарственные средства
- б) сильнодействующие средства

123. В сейфе с надписью «Б» находятся

- а) ядовитые и наркотические лекарственные средства
- б) сильнодействующие средства

124. Для учета прихода и расхода ядовитых и сильнодействующих средств ведется специальный журнал

- а) да
- б) нет

125. Журнал для учета ядовитых и сильнодействующих средств хранится

- а) 1 год
- б) 3 года
- в) 10 лет

126. Инъекционные растворы, настои, отвары, глазные капли, изготовленные в аптеке больницы, хранятся

- а) 2 суток
- б) 3 суток
- в) 10 суток

127. Эмульсии, приготовленные в аптеке больницы, хранятся

- а) 2 суток
- б) 3 суток
- в) 10 суток

128. Настои и отвары, приготовленные в аптеке больницы, некоторые антибиотики хранятся

- а) в шкафу
- б) в холодильнике
- в) в сейфе

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

129. Укажите допущенные ошибки при хранении лекарственных средств

- а) хранение лекарственных средств вместе с дезинфекционными средствами
- б) хранение некоторых лекарственных средств, приготовленных в аптеке, в холодильнике
- в) переливание лекарственных средств из одной ёмкости в другую
- г) хранение лекарственных средств с сильным запахом в отдельном шкафу
- д) переклеивание этикеток на лекарственных средствах

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

130. В чайной ложке содержится водного раствора

- а) 5 мл
- б) 10 мл
- в) 15 мл

131. В десертной ложке содержится водного раствора

- а) 5 мл
- б) 10 мл
- в) 15 мл

132. В столовой ложке содержится водного раствора

- а) 5 мл
- б) 10 мл
- в) 15 мл

ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

133. Лечебное питание (диетотерапия) – это рацион питания человека, учитывающий

- а) перечень разрешенных и запрещенных продуктов и блюд
- б) интервалы в приеме пищи
- в) место приема пищи
- г) способы кулинарной обработки

134. Диеты делятся на

- а) индивидуальные
- б) свободные
- в) общие
- г) регламентированные
- д) групповые

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

135. Диету №1 назначают при

- а) язвенной болезни и обострении хронического гастродуоденита
- б) энтероколитах
- в) заболеваниях печени и желчевыводящих путей

136. Диету №2 назначают при

- а) колитах с запорами
- б) заболеваниях печени
- в) гастритах, гастродуоденитах и колитах в период выздоровления

137. Диету №3 назначают при

- а) жидком стуле
- б) запорах
- в) язвенной болезни

138. Диету №4 назначают при

- а) заболеваниях печени и желчевыводящих путей
- б) ожирении
- в) заболеваниях кишечника, сопровождающихся поносами (энтероколитах)

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

139. Диету №5 назначают при

- а) заболеваниях печени и желчевыводящих путей
- б) язвенной болезни
- в) заболеваниях кишечника, сопровождающихся запорами
- г) пиелонефрите

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

140. Диету №6 назначают при

- а) заболеваниях печени и желчевыводящих путей
- б) повышенном образовании солей (дисметаболических нефропатиях)
- в) ожирении

141. Диету №7 назначают при

- а) ожирении
- б) нефрите
- в) заболеваниях печени и желчевыводящих путей

142. Диету №8 назначают при

- а) ожирении
- б) нефрите
- в) сахарном диабете

143. Диету №9 назначают при

- а) ожирении
- б) сахарном диабете
- в) анемии

144. Диету №10 назначают при

- а) сахарном диабете
- б) заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- в) ожирении

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

145. Диету №11 назначают при

- а) повышенной кровоточивости
- б) анемиях
- в) истощении

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

146. Диету №13 назначают при

- а) острых инфекционных заболеваний
- б) анемиях
- в) сахарном диабете

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

147. Диету №15 назначают для питания

- а) лечебного
- б) физиологического
- в) детей от 3 до 15 лет
- г) детей ясельного возраста

148. Диету №16 назначают для питания

- а) лечебного
- б) физиологического
- в) детей от 3 до 15 лет
- г) детей ясельного возраста

149. В гипоаллергенной диете из рациона питания исключают

- а) шоколад
- б) рыба
- в) мясо
- г) яйца
- д) орехи

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

150. Необходимую диету больному назначает

- а) лечащий врач
- б) врач-диетолог стационара
- в) постовая медицинская сестра
- г) старшая медицинская сестра

- 151. В больницах пища готовится**
а) централизованно на пищеблоке
б) по отделениям

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 152. Раздают пищу**
а) буфетчицы
б) постовые медицинские сестры
в) врачи
г) санитарки

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 153. Раздача пищи детям должна быть закончена после ее приготовления не позднее, чем через**
а) 30 минут
б) 1 час
в) 2 часа
г) 3 часа

- 154. Кормление тяжелобольных проводится**
а) в столовой
б) на сестринском посту
в) в палате

- 155. Моечные ванны для обработки столовой посуды должны быть**
а) односекционными
б) многосекционными (2-х – 4-х)

- 156. Уборку буфета и столовой проводят**
а) 1 раз в день
б) 2 раза в день
в) после каждой раздачи пищи

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 157. В буфете можно хранить**
а) молочные продукты
б) хлеб (не более суток)
в) хлеб (не более 2-х суток)
г) сахар
д) чай

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- 158. Укажите порядок обработки столовой посуды после использования**
а) промывание проточной водой
б) сушка в сухожаровом шкафу
в) удаление остатков пищи
г) замачивание в дезинфицирующем растворе

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 159. Режим обработки столовой посуды после использования включает**
а) замачивание в дезинфицирующем растворе
б) сушку в сухожаровом шкафу
в) стерилизацию в автоклаве
г) удаление остатков пищи

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 160. Замачивание столовой посуды проводят в дезинфицирующем растворе с t (°C)**
а) 15
б) 30
в) 50
г) 70-80

- 161. Ополаскивание столовой посуды после мытья проводится**
а) холодной водой
б) теплой водой (30°C)
в) горячей водой (60-65°C)
г) дезинфицирующим раствором

- 162. Ополаскивание столовой посуды после мытья проводится**
а) в моечной ванне, наполненной водой
б) под проточной водой
в) в отдельном баке

- 163. Замачивание и обработку столовой, чайной посуды и столовых приборов проводят**
а) вместе
б) отдельно

- 164. В сухожаровом шкафу сушат и дезинфицируют посуду при температуре (°C)**
а) 100
б) 130
в) 160

- 165. В сухожаровом шкафу сушат и дезинфицируют посуду в течение (время в мин)**
а) 15
б) 30
в) 45

- 166. Для мытья столовой посуды в больнице используют**
а) губки
б) мочалки
в) ветошь

- 167. После раздачи остатки пищи хранить**
а) разрешается
б) не разрешается
в) можно хранить отдельные блюда

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 168. Выдача передач детям проводится**
а) после основного приема пищи
б) перед обедом и ужином
в) 2 раза в день
г) 3 раза в день

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ДЕТЬМИ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

169. Дом ребенка – это учреждение
- лечебно-профилактическое
 - консультативно-диагностическое
 - для содержания, воспитания, лечения детей-сирот и детей, временно разлученных с родителями

170. В доме ребенка воспитываются дети
- от 1 мес. до 3-х лет
 - от 3-х до 7 лет
 - школьного возраста

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

171. Воспитание детей и уход за ними в доме ребенка осуществляется
- санитарками
 - средним медицинским персоналом
 - педагогами-воспитателями

172. Медицинским сестрам при работе с грудными детьми не разрешается носить
- хлопчатобумажные платья, костюмы
 - шерстяные вещи
 - кольца, бижутерию
 - часы

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

173. Для детей первого года жизни оптимальной температурой в комнате является (t в $^{\circ}\text{C}$)
- 19-20
 - 20-22
 - 23-25
 - 25-27

174. Температура воды при подмывании детей первого года жизни должна быть (t в $^{\circ}\text{C}$)
- 20-25
 - 25-30
 - 37-38
 - 40-45

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

175. Правила подмывания детей включают
- подмывание девочек в направлении от лобка к анусу
 - подмывание девочек в направлении от ануса к лобку
 - подмывание производят под струей теплой воды
 - подмывание производят непроточной водой (в тазике)

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

176. После подмывания кожу ребёнка
- вытирают пелёнкой
 - промокают пелёнкой
 - высушивают феном

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

177. После подмывания кожу здорового ребенка 1-го полугодия жизни обрабатывают
- мазью с антибиотиком
 - стерильным растительным маслом
 - специальным детским кремом
 - водным 0,02% раствором хлоргексидина
 - не обрабатывают

178. Утренний туалет ребенка первого года жизни включает
- умывание лица
 - обработку глаз
 - мытьё головы
 - обработку слизистой полости рта 2% раствором соды

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

179. Ежедневный уход за глазами у детей 1-го года жизни включает обработку глаз стерильным ватным тампоном, смоченным
- теплой кипяченой водой
 - теплой водопроводной водой
 - дистиллированной водой

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

180. Глаза промывают
- от наружного угла глаза к внутреннему
 - от внутреннего угла к наружному
 - одним тампоном оба глаза
 - каждый глаз отдельным тампоном

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

181. Полость рта здоровым детям 1-го года жизни
- протирают после каждого приема пищи
 - протирают 1 раз в день
 - не протирают

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

182. Умывание лица детям первых месяцев жизни проводят
- кипячёной водой
 - водой из-под крана
 - водой с температурой 22-24 $^{\circ}\text{C}$
 - водой с температурой 36-37 $^{\circ}\text{C}$
 - в направлении от периферии к центру

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

183. Умывать ребенка некипячёной водой комнатной температуры можно с
- 1 месяца
 - 3 месяцев
 - 4-5 месяцев
 - 2-го полугодия жизни

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

184. Ежедневный туалет носовых ходов у детей первого года жизни проводят
- ватным жгутиком, смоченным стерильным вазелиновым или растительным маслом
 - каждый носовой ход отдельным жгутиком
 - одним жгутиком оба носовых хода
 - глубина введения жгутика составляет 1,0-1,5 см
 - глубина введения жгутика составляет 1,5-3,0 см

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

185. Купание ребенка первого полугодия жизни проводят
- два раза в день
 - один раз в день
 - через день
 - два раза в неделю

186. Гигиеническая ванна детям второго полугодия жизни проводится
- 2 раза в день
 - ежедневно
 - через 1 день
 - 2 раза в неделю

187. Температура воды при проведении гигиенической ванны ребенку 1-го полугодия жизни должна быть (t в °C)
- 35-35,5
 - 35,5-36
 - 36,0-36,5
 - 36,5-37
 - 37-38

188. Продолжительность гигиенической ванны для детей 1-го года жизни в детском учреждении, как правило, не превышает
- 5 минут
 - 5-10 минут
 - 10-15 минут
 - 15-20 минут

189. Мыло при купании детей 1 года жизни используют
- 1 раз в неделю
 - 2 раза в неделю
 - 3 раза в неделю
 - ежедневно

190. Голову ребенка при купании рекомендуется мыть с мылом
- 1 раз в неделю
 - 2 раза в неделю
 - через день
 - каждый день

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

191. При пеленании детей в детских учреждениях на ребенке I полугодия жизни должны быть надеты
- 1 распашонка
 - 2 распашонки
 - 3 распашонки
 - 1 пеленка
 - 2-3 пеленки
 - 5-6 пеленок

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

192. Ползунки в одежде детей используют
- сразу после рождения
 - с 1 месяца
 - с 1-2 месяцев
 - с 3-4 месяцев

193. Памперсы у грудных детей используют с
- рождения
 - 1 месяца
 - 2-3 месяцев
 - 3-5 месяцев

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

194. Памперсы детям первых месяцев жизни следует менять
- после каждого стула
 - после мочеиспусканий по мере наполнения
 - 3 раза в день
 - 2 раза в день

195. Правила кормления грудью матери включают
- соблюдение матерью правил гигиены
 - сцеживание нескольких первых капель молока и обработка ими соска
 - прикладывание ребенка к одной груди при одном кормлении
 - поочередное прикладывание ребенка к 2-м грудям при одном кормлении
 - обработку сосков перед прикладыванием к груди дезинфицирующим раствором
 - орошение груди теплым душем перед кормлением

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

196. Ребенка первых 2-х месяцев жизни рекомендуется кормить грудью матери
- каждые 3 часа
 - по требованию ребенка
 - каждые 2,5 часа
 - каждые 4 часа

197. При контрольном кормлении ребёнка взвешивают
- только до кормления грудью матери
 - только после кормления грудью матери
 - после кормления сцеженным молоком из бутылочки
 - до и после кормления грудью

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

198. Контрольное кормление это проверка количества молока высосанного ребёнком
- из бутылочки
 - из груди матери
 - за сутки
 - за одно кормление

199. Контрольное кормление проводится
- при заболеваниях ребенка
 - при недостаточной прибавке ребенка в массе
 - постоянно всем детям
 - при дефиците молока у матери

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 200. Сцеженное грудное молоко при использовании в течение суток следует хранить**
- при комнатной температуре
 - в холодильнике при t не выше 10°C
 - в холодильнике при t не выше 4°C
 - в морозильнике
- 201. Грудное молоко после сцеживания можно использовать без стерилизации при правильном хранении максимально в течение**
- 1-2 часов
 - 2-4 часов
 - 3-6 часов
 - 6-8 часов
- 202. Смешанное вскармливание – это кормление ребенка**
- грудью матери и дополнительно соками и фруктовыми пюре
 - грудью матери и дополнительно молочными смесями
 - грудью матери и блюдами прикорма
- 203. Искусственное вскармливание – это кормление ребенка**
- сцеженным материнским молоком
 - детскими молочными смесями
 - грудным молоком и детскими молочными смесями

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 204. При кормлении ребенка из бутылочки с соской следует**
- кормить ребенка во сне
 - кормить в положении на боку и не отходить от него
 - кормить при бодрствовании
 - горлышко у бутылочки должно быть постоянно заполнено молоком

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 205. При кормлении ребенка через отверстие в соске молочная смесь должна**
- вытекать каплями
 - литься струйкой
 - литься сильной струей
- 206. При кормлении ребенка молочную смесь подогревают до (t в $^{\circ}\text{C}$)**
- комнатной t°
 - 25-30
 - 37-40
 - 40-43
- 207. Сухую детскую молочную смесь для кормления ребенка**
- разводят заранее и хранят в холодильнике
 - разводят непосредственно перед кормлением

- 208. Вид молочной смеси, её объем и частоту кормлений рекомендует**
- врач - диетолог
 - лечащий врач
 - мед. сестра
 - мать ребенка

- 209. Замачивание и мытье бутылочек проводят**
- в горячей воде
 - в холодной воде
 - в горячем растворе хозяйственного мыла
 - в дез. растворе с $t=50^{\circ}\text{C}$

- 210. Ополаскивание бутылочек проводят**
- холодной водой
 - теплой водой 37°C
 - горячей водой 65°C
 - горячим дезинфицирующим раствором

- 211. В сухожаровом шкафу стерилизуют бутылочки при температуре($^{\circ}\text{C}$)**
- 100
 - 130
 - 160

- 212. В сухожаровом шкафу бутылочки стерилизуют в течение (время в мин)**
- 15
 - 30
 - 45
 - 60

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 213. Простерилизованные бутылочки**
- закрывают стерильным ватно-марлевым тампоном до стерилизации
 - закрывают после стерилизации
 - оставляют открытыми до стерилизации
 - хранят в шкафу в буфетной
 - хранят на сестринском посту

- 214. Обработка грязных сосок включает**
- выворачивание их наизнанку
 - замачивание в дез. растворе
 - мытьё в теплом 1% растворе соды
 - кипячение 10-15 минут
 - кипячение 30 минут

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 215. Чистые соски хранят в посуде с маркировкой «Чистые соски»**
- в стерильной воде
 - в дез. растворе
 - сухими

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!

216. Для стула детей на грудном вскармливании характерны

- а) полужидкая или кашицеобразная консистенция
- б) оформленный стул
- в) кислый запах
- г) резкий запах
- д) частота 6-8 раз в сутки
- е) частота 1-2 раза в сутки

217. Для стула детей на искусственном вскармливании характерны

- а) жидкая консистенция
- б) густая консистенция
- в) желтый цвет
- г) желто-серый цвет
- д) наличие примесей слизи, зелени
- е) частота 1-3 раза в сутки

218. Профилактика деформаций скелета у детей 1-го полугодия жизни включает

- а) плотный матрац в детской кроватке
- б) мягкий матрац в детской кроватке
- в) высокую подушку под головой ребенка
- г) отсутствие подушки
- д) регулярную смену положения ребенка в постели
- е) тугое пеленание ребенка

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!

219. При воспитании детей раннего возраста предпочтение отдают таким средствам воспитания как

- а) занятия физкультурой
- б) организация игр-занятий с набором игрушек
- в) формирование навыков личной гигиены и самообслуживания
- г) занятия рисованием и лепкой
- д) воспитательные беседы
- е) занятия гимнастикой с элементами массажа

220. В понятие режима дня входит правильное распределение по времени в течение суток

- а) сна
- б) числа кормлений
- в) числа мочеиспусканий и испражнений
- г) активной деятельности ребенка
- д) прогулок

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

221. У детей 2-го полугодия жизни продолжительность ночного сна (в часах) составляет

- а) 5
- б) 8
- в) 11
- г) 14

222. У детей от 1 года до 6 лет продолжительность ночного сна (в часах) составляет

- а) 5
- б) 8
- в) 11
- г) 14

223. Суммарная продолжительность дневного сна у детей 2-го полугодия жизни составляет

- а) 2-3 часа
- б) 3-4 часа
- в) 4-5 часов
- г) 5-6 часов

224. Суммарная продолжительность дневного сна у детей от 1 года до 1,5 лет составляет

- а) 1,5-2,5 часа
- б) 2-3,5 часа
- в) 3,5-4 часа
- г) 4-4,5 часа

225. Продолжительность дневного сна у детей от 1,5 лет до 3 лет составляет

- а) 1-1,5 часа
- б) 1,5-2 часа
- в) 2,5-3 часа
- г) 3-4 часа

226. Ребенок 2-го полугодия жизни днем спит

- а) 1 раз
- б) 2 раза
- в) 2-3 раза
- г) 3-4 раза

227. Ребенок от 1 года до 1,5 лет днем спит

- а) 1 раз
- б) 2 раза
- в) 3 раза
- г) 4 раза

228. Ребенок от 1,5 до 3 лет днем спит

- а) 1 раз
- б) 2 раза
- в) 3 раза

229. Число кормлений у ребенка на искусственном вскармливании в возрасте до 2-3 месяцев составляет

- а) 8-10 раз
- б) 7-8 раз
- в) 6-7 раз
- г) 5-6 раз

230. Число кормлений у детей 2-го полугодия жизни составляет

- а) 3 раза
- б) 4 раза
- в) 5 раз
- г) 6 раз

231. Число кормлений у детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет составляет

- а) 2-3 раза
- б) 3-4 раза
- в) 4-5 раз
- г) 5-6 раз

232. Число кормлений у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет

- а) 2
- б) 3
- в) 4
- г) 5

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!

233. Одежда у детей раннего возраста должна быть

- а) красивой, яркой
- б) свободной, не стеснять движений
- в) с большим количеством застежек
- г) по возрасту и росту
- д) утепленной
- е) легко впитывать влагу и стираться

234. Игрушки для детей раннего возраста должны

- а) соответствовать возрасту
- б) быть только крупными
- в) быть только мелкими
- г) быть разнообразными по величине, форме, плотности
- д) легко мыться
- е) быть предпочтительно мягкими

235. Массаж должен проводиться

- а) всем детям 1-го года жизни
- б) всем детям 1-го года жизни, не имеющим противопоказаний
- в) с 2-3 мес жизни
- г) после 6 месяцев

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 236. Занятия гимнастикой с элементами массажа начинают**
- а) с 1-2 мес жизни
 - б) после 6 мес жизни
 - в) после 1 года жизни
- 237. Детям 1-го года жизни в комплекс гимнастических упражнений включают активные движения после**
- а) 3 месяцев
 - б) 4-6 месяцев
 - в) 6-9 месяцев
- 238. Закаливание – это система мероприятий по**
- а) организации режима дня
 - б) организации правильного питания детей
 - в) повышению сопротивляемости организма ребенка путем систематического дозированного воздействия природных факторов
 - г) организации игр в игровой комнате
- 239. Сущность закаливания состоит в**
- а) тренировке механизмов терморегуляции
 - б) тренировке механизмов пищеварения
 - в) тренировке функции внешнего дыхания

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 240. К правилам закаливания ребенка относятся**
- а) индивидуальный подход
 - б) постепенное уменьшение времени воздействия закаливающего фактора
 - в) постепенное увеличение времени воздействия закаливающего фактора
 - г) систематичность
 - д) не прекращать при заболеваниях
- 241. К закаливающим факторам относятся**
- а) воздух
 - б) физические упражнения
 - в) солнечные лучи
 - г) рациональное питание
 - д) воздействие температурного фактора
 - е) вода
- 242. Проводить закаливание можно**
- а) только здоровому ребенку
 - б) больным детям
 - в) в любое время года
 - г) только в теплое время года

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 243. Начинать закаливание нужно с**
- а) водных процедур
 - б) воздушных ванн
 - в) солнечных процедур
- 244. Закаливание воздухом (воздушные ванны) назначают детям с**
- а) 2-3 недель
 - б) 1-1,5 месяцев
 - в) 1,5-3 месяцев

- 245. Обтирание влажной рукавичкой проводят, начиная с**
- а) 6 месяцев
 - б) 1 года
 - в) 2 лет
- 246. Температуру воды (°С) при обтирании влажной рукавичкой для детей до 1 года постепенно снижают до**
- а) 25-26
 - б) 26-28
 - в) 28-30
 - г) 32-35
- 247. Обливание водой проводят, начиная с**
- а) 6 месяцев
 - б) 1 года
 - в) 1-1,5 лет
 - г) 2 лет
 - д) 3 лет
- 248. Детям до 3-х лет температуру воды(°С) при общем обливании постепенно снижают до**
- а) 23-25
 - б) 25-27
 - в) 27-28
 - г) 28-30
 - д) 33- 35

- 249. Закаливание детей плаванием можно начинать с**
- а) 1 месяца
 - б) 6 месяцев
 - в) 9 месяцев
 - г) после 1 года
- 250. Купание в реке, море можно начинать детям с**
- а) 1 года
 - б) 2-х лет
 - в) 3-х лет
 - г) 5-ти лет
- 251. Температура воды (°С) при купании детей в реке, море должна быть не ниже**
- а) 15
 - б) 18
 - в) 20
 - г) 22
 - д) 24

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 252. Закаливание детей раннего возраста солнечными лучами проводится**
- а) под прямыми лучами солнца
 - б) при рассеянных солнечных лучах
 - в) преимущественно в утренние часы
 - г) в любое время дня
 - д) не проводится

ТЕРМОМЕТРИЯ И УХОД ЗА ЛИХОРАДЯЩИМИ БОЛЬНЫМИ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

253. Температуру тела в стационаре измеряют

- а) ежедневно
- б) через 1 день
- в) 1 раз в неделю
- г) 2 раза в день

254. Температуру тела измеряют

- а) натошак
- б) после еды
- в) в фиксированные часы
- г) в разные часы

255. Ежедневно температуру тела в стационаре измеряют в

- а) 6-8 часов
- б) 8-10 часов
- в) 16-18 часов
- г) 18-20 часов

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

256. Температуру тела ртутным термометром чаще всего измеряют в

- а) паховой складке
- б) подмышечной впадине
- в) прямой кишке
- г) на коже в области лба

257. Температуру тела измеряют после пробуждения

- а) сразу
- б) через 30 минут
- в) через 1 час

258. Измерение температуры тела ртутным термометром проводят не менее

- а) 5 минут
- б) 10 минут
- в) 15 минут
- г) 20 минут

259. Термометры хранят

- а) в сухой, чистой банке или лотке
- б) в банке с дезинфицирующим раствором

260. Сразу после использования термометр

- а) протирают влажной салфеткой
- б) дезинфицируют в дезинфицирующем растворе
- в) ставят в сухую, чистую банку

261. Нормальной считается температура тела ($^{\circ}\text{C}$)

- а) от 35,5 до 36,5
- б) от 36 до 37
- в) от 36,5 до 37,5

262. Температура в прямой кишке по сравнению с температурой ($^{\circ}\text{C}$) в подмышечной впадине

- а) выше на 0,5-1
- б) ниже на 0,5-1
- в) выше на 1-1,5
- г) ниже на 1-1,5

263. Субфебрильной называется температура тела ($^{\circ}\text{C}$)

- а) 37-38
- б) 38-38,9
- в) 39-40,5

264. Фебрильной называется температура тела ($^{\circ}\text{C}$)

- а) 37-38
- б) 38-38,9
- в) 39-40,5

265. Гипертермической называется повышение температуры ($^{\circ}\text{C}$) тела выше

- а) 37
- б) 38
- в) 39

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

266. К симптомам, характерным для начального периода повышения температуры тела, относятся

- а) чувство жара
- б) озноб
- в) слабость
- г) боли в животе
- д) головная боль
- е) рвота

267. К симптомам, характерным для периода максимального повышения температуры тела, относятся

- а) озноб
- б) чувство жара
- в) резкая слабость
- г) сильная головная боль
- д) бледность кожи
- е) возбуждение

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

268. У высоко лихорадящего больного температуру тела измеряют

- а) 2 раза в день
- б) каждые 6 часов
- в) каждые 2 - 3 часа

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

269. В начальном периоде повышения температуры тела следует

- а) укрыть ребенка одеялом
- б) раздеть ребенка
- в) напоить теплым чаем
- г) напоить холодной водой
- д) приложить к ногам теплую грелку

270. У высоко лихорадящего больного для снижения температуры тела применяют следующие физические методы охлаждения

- а) пузырь со льдом на область печени, головы
- б) клизмы с прохладной водой
- в) обтирание кожи спиртовым раствором
- г) сквозное проветривание комнаты, где находится больной

- 271. У лихорадящего больного для снижения температуры тела применяют**
- а) раздевание
 - б) обдувание вентилятором
 - в) лечебные ванны с отваром трав
 - г) холод на область головы и бедренных сосудов
- 272. Лекарственные средства для снижения температуры тела ребёнку с гипертермией назначает**
- а) лечащий врач
 - б) дежурный врач
 - в) постовая медицинская сестра
 - г) старшая медицинская сестра
- 273. Критическое снижение температуры тела характеризуется**
- а) быстрым падением температуры тела
 - б) постепенным снижением температуры тела
 - в) развитием сильной слабости, обильного потоотделения
 - г) падением артериального давления
- 274. Литическое снижение температуры тела характеризуется**
- а) быстрым падением температуры тела
 - б) постепенным снижением температуры тела
 - в) развитием сильной слабости, обильного потоотделения
 - г) развитием умеренной слабости, небольшой испарины
- 275. У лихорадящего больного медицинская сестра должна контролировать**
- а) температуру тела
 - б) общее состояние
 - в) размеры печени и селезенки
 - г) пульс и артериальное давление
 - д) количество выпитой жидкости и выделенной мочи
- 276. Питание лихорадящего больного должно быть**
- а) более частым малыми порциями
 - б) более редким
 - в) с уменьшенным содержанием белка и жира
 - г) с увеличенным содержанием белка
 - д) с физиологическим объемом жидкости
 - е) с дополнительным приемом жидкости
- 277. Факторы, способствующие тепловому удару**
- а) пребывание в душном помещении с высокой температурой воздуха и влажностью
 - б) укутывание в теплую одежду
 - в) голод
 - г) несоблюдение питьевого режима
- 278. Для оказания неотложной помощи при солнечном или тепловом ударе следует**
- а) обеспечить доступ свежего прохладного воздуха
 - б) накрыть одеялом
 - в) дать холодное питье
 - г) растереть кожу спиртовым раствором
 - д) приложить холодный компресс к голове

УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

279. Атопический дерматит – это заболевание кожи

- а) аллергического генеза
- б) инфекционного генеза
- в) паразитарного генеза

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

280. Атопический дерматит проявляется

- а) покраснением и отечностью кожи
- б) сухостью кожи
- в) появлением гнойных пузырьков
- г) зудом кожи

281. Причинно-значимыми аллергенами при атопическом дерматите чаще всего являются

- а) рис, греча
- б) яйца
- в) шоколад
- г) белокочанная капуста
- д) рыба
- е) орехи

282. При атопическом дерматите из рациона исключают

- а) все облигатные аллергены
- б) все выявленные аллергены
- в) свежие овощи и фрукты
- г) сладости

283. При наблюдении за ребенком с атопическим дерматитом мед. сестра

- а) следит за соблюдением назначенной диеты
- б) следит за переносимостью продуктов питания
- в) назначает лечебные процедуры по уходу за кожей
- г) следит за состоянием кожи, стулом
- д) контролирует частоту пульса и дыханий

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

284. При мокнущей форме атопического дерматита для местного лечения предпочтительнее использовать

- а) мази
- б) болтушки-суспензии
- в) примочки с лекарственными средствами

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

285. Для примочек используют

- а) раствор лекарственного средства в дистиллированной воде
- б) суспензии с лекарственным средством
- в) марлевые салфетки из 2-3 слоев
- г) марлевые салфетки из 4-5 слоев

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

286. Марлевые салфетки, смоченные в лекарственном растворе для примочек, меняют каждые

- а) 5 мин
- б) 10-15 мин
- в) 15-20 мин
- г) 40 мин

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

287. Мазь, пасты, болтушки наносятся на пораженные участки кожи

- а) при помощи марлевого (ватного) тампона
- б) при помощи шпателя
- в) непосредственно руками мед. сестры

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

288. При накладывании мазевой повязки на пораженный очаг используют

- а) марлевую салфетку
- б) компрессную бумагу
- в) вату
- г) бинт
- д) гипсовую лангету

289. Лечебные ванны отличаются от гигиенических тем, что

- а) проводятся ежедневно
- б) проводятся через день
- в) проводятся по мере необходимости
- г) в воду добавляется лекарственное средство

290. При заболеваниях кожи лечебные ванны проводятся с добавлением в воду чаще всего

- а) крахмала или отрубей
- б) раствора соды
- в) раствора фурацилина
- г) настоя ромашки или череды
- д) настоя мяты

291. Лечебные крахмальные ванны используются для

- а) подсушивания кожи
- б) смягчения кожи
- в) снятия зуда
- г) дезинфекции кожи

292. Лечебная ванна с настоем ромашки используется для

- а) подсушивания кожи
- б) снятия зуда
- в) снятия воспалительных явлений
- г) дезинфекции кожи

293. Потница развивается вследствие

- а) раздражения выводных протоков сальных желез
- б) раздражения выводных протоков потовых желез
- в) перегревания ребенка
- г) переохлаждения ребенка
- д) дефектов ухода за кожей

294. Элементы ухода и лечения кожи детей при потнице включают

- а) устранение дефектов ухода
- б) мазевые повязки
- в) лечебные ванны с крахмалом
- г) лечебные ванны с настоем ромашки

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

295. Пиодермия – это поражение кожи

- а) вирусное
- б) гнойничковое бактериальное
- в) аллергическое
- г) паразитарное
- д) грибковое

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

296. Возбудителями пиодермии у детей чаще всего являются

- а) пневмококки
- б) стафилококки
- в) кишечная палочка
- г) стрептококки

297. Местное лечение при пиодермии включает

- а) устранение дефектов ухода за кожей
- б) лечебную ванну с раствором череды
- в) содовую лечебную ванну
- г) смазывание элементов 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- д) смазывание элементов спиртовым раствором йода

298. При пиодермии здоровые участки кожи вокруг пораженных обрабатывают

- а) 1% спиртовыми растворами анилиновых красителей
- б) 2% салициловым спиртом
- в) хлоргексидиновым спиртом
- г) 1% раствором соды

299. Опрелость (пеленочный дерматит) – это воспалительный процесс на коже, проявляющийся

- а) покраснением кожи
- б) мокнутием кожи
- в) гнойничковыми элементами
- г) эрозиями
- д) сыпями (пятна и папулы)

300. Опрелости чаще появляются

- а) в кожных складках
- б) на лице
- в) на руках
- г) на ягодицах и в промежности

301. Уход за кожей ребенка при опрелостях включает

- а) частое пеленание
- б) редкое пеленание
- в) использование памперсов
- г) отказ от регулярного использования памперсов
- д) лечебные ванны с отваром ромашки, череды
- е) обработку пораженной кожи специальными детскими кремами

302. Если опрелость сопровождается мокнутием, показаны

- а) смазывание пораженных участков вазелиновым маслом
- б) УФО пораженных участков
- в) аэрация
- г) местные лечебные ванны с отваром коры дуба

303. Обработка волосистой части головы при гнейсе включает

- а) смазывание корочек стерильным вазелиновым маслом
- б) накладывание масляной повязки на всю ночь
- в) накладывание масляной повязки на 2-3 часа
- г) накладывание примочек с раствором спирта
- д) после обработки мытьё головы с удалением корочек

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

304. Молочница – это грибковое поражение слизистой оболочки полости рта и языка, проявляющееся

- а) покраснением
- б) появлением бело-серого налета
- в) изъязвлением

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

305. Лечение молочницы включает смазывание слизистых оболочек ротовой полости и языка

- а) 6% раствором соды
- б) отваром ромашки
- в) 1% водным раствором бриллиантового зеленого
- г) использование противогрибковых препаратов по назначению врача

306. Развитию грибковых поражений кожи и слизистых оболочек (кандидоз) у детей способствуют

- а) предрасположенность к аллергии
- б) дефекты ухода за кожей
- в) лечение антибиотиками
- г) снижение иммунитета

307. Уход и лечение при грибковых поражениях кожи у детей включает

- а) регулярные гигиенические ванны
- б) устранение дефектов ухода за кожей
- в) смазывание пораженных участков хлоргексидиновым спиртом
- г) смазывание пораженных участков 1% водным раствором бриллиантового зеленого
- д) использование противогрибковых мазей и препаратов по назначению врача

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

308. Чесотка – это заболевание кожи, вызываемое

- а) бактериями
- б) вирусами
- в) грибами
- г) клещами
- д) вшами

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

309. Чесотка передается

- а) контактно-бытовым путем
- б) при чихании и кашле
- в) орально-фекальным путем
- г) при использовании белья, предметов гигиены и постельных принадлежностей больного

- 310. Для лечения чесотки используют**
- а) 20% водно-мыльную суспензию бензилбензоата
 - б) 20% мазь бензилбензоата
 - в) хлоргексидиновый спирт
 - г) спиртовой раствор бриллиантового зеленого
 - д) аэрозоль «Спрегаль»

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 311. Для лечения чесотки 20% мазь бензилбензоата втирают в кожу**
- а) только пораженных участков
 - б) по всей поверхности тела
 - в) по всей поверхности тела, кроме головы, лица, шеи

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 312. Чтобы добиться эффекта при лечении чесотки, следует**
- а) лечить только больного ребенка
 - б) лечить одновременно с больным ребенком всех, кто живет рядом
 - в) дезинфицировать одежду и постельные принадлежности
 - г) дезинфицировать одежду и постельные принадлежности не следует
 - д) лечить контактных детей, жалующихся на зуд (при подозрении на чесотку)

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 313. Герпетическое поражение кожи вызывается**
- а) бактериями
 - б) грибами
 - в) вирусам
 - г) клещами

- 314. Герпетическое поражение кожи характеризуется появлением**
- а) трещин
 - б) пятен красного цвета
 - в) зудящих пузырьков

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

315. К респираторным заболеваниям детей относятся
- ОРВИ
 - пневмония
 - бронхит
 - гепатит
 - бронхиальная астма
316. При поражении органов дыхания чаще встречаются следующие симптомы
- одышка
 - насморк
 - боли в животе
 - кашель
 - отеки

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

317. Температура (в °С) в палатах для детей с заболеваниями органов дыхания должна быть
- 15-18
 - 18-20
 - 20-25
318. Проветривать палаты для детей с заболеваниями органов дыхания необходимо не менее
- 1-2 раз в день
 - 3-4 раз в день
 - 4-5 раз в день

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

319. В рационе питания и водно-питьевом режиме больных с заболеваниями органов дыхания следует предусмотреть
- снижение объема пищи
 - увеличение объема пищи
 - увеличение числа кормлений
 - уменьшение числа кормлений
 - увеличение количества жидкости
 - уменьшение количества жидкости
320. При насморке для облегчения дыхания мед. сестра проводит
- очищение носа
 - полоскание горла
 - паровые содовые ингаляции
 - промывание носа
 - закапывание сосудосуживающих капель по назначению врача

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

321. Ларингоспазм – это
- воспалительное заболевание гортани
 - внезапное значительное сужение просвета гортани
 - порок развития гортани

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

322. Неотложная доврачебная помощь при ларингоспазме
- похлопать ребенка по щекам
 - дать воды
 - срочно вызвать врача
 - опрыскать лицо холодной водой
 - сделать очистительную клизму
323. При попадании инородного тела в дыхательные пути ребенка медицинской сестре следует
- дать ребенку кислород
 - придать ребенку положение головой вниз и постучать по спине
 - проводить дыхание «рот в рот»
 - срочно вызвать врача
324. При попадании инородного тела в носовые ходы ребенка необходимо
- закапать в нос персиковое масло
 - удалить инородное тело пинцетом
 - плотно закрыв одну ноздрю, попросить ребенка высморкаться
 - срочно вызвать врача
325. О ложном крупе (остром стенозирующем ларинготрахеите) свидетельствует появление
- приступообразного лающего кашля
 - осиплости голоса
 - одышки с затрудненным выдохом
 - одышки с затрудненным вдохом
326. Неотложная доврачебная помощь при стенозирующем ларингите включает проведение
- ножной горячей ванны
 - ингаляции теплого влажного воздуха;
 - согревающего компресса на область гортани
 - срочный вызов врача
327. При стенозирующем ларингите до прихода врача необходимо
- успокоить ребенка
 - дать теплое щелочное питье
 - дать теплое подкисленное питье
 - обеспечить приток свежего воздуха
 - провести теплую ванну
328. Отит – это
- порок развития уха
 - воспаление уха
 - воспаление миндалин
 - осложнение или проявление респираторной инфекции
329. Одышка – это
- остановка дыхания
 - нарушение частоты дыхания
 - чувство нехватки воздуха
 - затруднение дыхания с нарушением глубины, ритма и частоты

330. **Помощь при одышке включает**
 а) освобождение дыхательных путей от слизи и мокроты
 б) тугое пеленание ребенка
 в) приподнятое положение головы и груди ребенка
 г) подачу увлажненного кислорода
331. **При бронхитах, пневмонии для облегчения дыхания следует**
 а) приподнять головной конец кровати
 б) опустить головной конец кровати
 в) чаще менять положение в кровати
 г) создать полный покой, запретить движения
332. **К мероприятиям, улучшающим отхождение мокроты, относятся**
 а) теплое щелочное питье;
 б) прием лекарственных средств, разжижающих мокроту
 в) прием лекарственных средств, подавляющих кашель
 г) вибрационный массаж

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

333. **Постуральный дренаж делают для лучшего отхождения**
 а) мочи
 б) мокроты
 в) газов и каловых масс
334. **Постуральный дренаж предусматривает**
 а) проведение ингаляций
 б) прием лекарственных средств, подавляющих кашель
 в) создание вынужденного положения тела головой вниз
 г) создание вынужденного положения тела с головой, приподнятой вверх
335. **Постуральный дренаж проводят**
 а) 1 раз в день в течение часа
 б) 2-3 раза в день по 20-30 минут
 в) постоянно
336. **Стимуляция активного кашля у детей раннего возраста достигается путем**
 а) массажа грудной клетки
 б) нажатия на крылья носа
 в) нажатия шпателем на корень языка

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

337. **Уход за больным с бронхиальной астмой включает:**
 а) поддержание оптимальной влажности и температуры в помещении
 б) контроль приема гипоаллергенной диеты
 в) щелочное питье
 г) проведение ингаляций при бронхоспазме
 д) ножные горячие ванны

338. **При приступе бронхиальной астмы до прихода врача необходимо**
 а) успокоить ребенка
 б) сделать теплую ванну
 в) обеспечить приток свежего воздуха
 г) уложить ребенка в кровать с приподнятым головным концом
 д) нажать шпателем на корень языка
 е) вызвать врача
339. **Подача кислорода (оксигенотерапия) больному с дыхательной недостаточностью может проводиться**
 а) через лицевую маску
 б) через носовой катетер
 в) в кислородную палатку (пластмассовый колпак, закрывающий голову и часть грудной клетки ребенка)
 г) через катетер, лежащий рядом с головой ребенка.
340. **Кислород при проведении оксигенотерапии должен подаваться**
 а) увлажненным
 б) осушенным
 в) в смеси с воздухом
 г) в чистом виде

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

341. **При проведении оксигенотерапии объемная скорость подачи кислорода в аппарат Боброва в 1 минуту составляет**
 а) 1-2 л
 б) 2-4 л
 в) 4-6 л
342. **При проведении ИВЛ частота вдуваний воздуха в дыхательные пути в 1 минуту у ребенка грудного возраста должна быть не менее**
 а) 20
 б) 40
 в) 50
 г) 60
343. **При проведении ИВЛ у детей старшего возраста частота вдувания воздуха в дыхательные пути в 1 минуту должна быть не менее**
 а) 20
 б) 30
 в) 40

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

344. **Для эффективного проведения ИВЛ необходимо**
 а) уложить ребенка на наклонную поверхность
 б) уложить ребенка на спину с откинутой назад головой
 в) очистить полость носо-ротоглотки (салфеткой или отсосом)
 г) фиксировать язык
345. **Критериями эффективности ИВЛ являются**
 а) исчезновение синюшной окраски кожи и слизистых оболочек
 б) появление кашля
 в) движения грудной клетки при вдохе
 г) дыхательный шум при выдохе

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

346. Укажите последовательность действий при оказании сердечно-легочной реанимации детям:
- а) ИВЛ
 - б) непрямой массаж сердца
 - в) оценка дыхания и сердечных сокращений
 - г) освобождение дыхательных путей

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

347. При насморке для удаления слизи нос промывают
- а) дистиллированной водой
 - б) физиологическим раствором
 - в) 3% раствором перекиси водорода
 - г) морской водой

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

348. Растворы для промывания носа подогревают до (температура в °С)
- а) 28-30
 - б) 33-35
 - в) 36-37
 - г) 38-40

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

349. Носовые ходы при насморке очищают от слизи и корок
- а) ватными жгутиками, смоченными в вазелиновом масле
 - б) сухим носовым платком
 - в) резиновым баллончиком
350. Сосудосуживающие капли при насморке вводят
- а) до очищения носовых ходов
 - б) после очищения носовых ходов
 - в) до кормления ребенка
 - г) после кормления ребенка
351. Перед введением капель в нос ребенку
- а) голову следует запрокинуть назад
 - б) голову следует запрокинуть назад и набок
 - в) приподнять кончик носа
 - г) опустить кончик носа

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

352. После закапывания капель в носовой ход следует оставить голову ребенка в том же положении на
- а) 1-2 минуты
 - б) 2-4 минуты
 - в) 5-7 минут
 - г) 7-10 минут
353. Капли, вводимые в нос, в конъюнктивальный мешок глаз, должны быть подогреты на водяной бане до (температура в °С)
- а) температуры тела (36-37)
 - б) комнатной температуры (22-24)
 - в) 38-40

354. Полоскание зева и глотки можно проводить детям с
- а) 1 года
 - б) 4-5 лет
 - в) 7-8 лет
 - г) 10 лет

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

355. При введении капель в наружный слуховой проход детям старше 2-х лет необходимо
- а) уложить ребенка на спину
 - б) уложить или усадить ребенка так, чтобы больное ухо было сверху
 - в) ушную раковину слегка оттянуть кзади и вверх
 - г) ушную раковину слегка оттянуть кзади и вниз
356. Капли в уши при отите вводят
- а) до очищения наружного слухового прохода
 - б) после очищения наружного слухового прохода
 - в) в количестве 1-2 капли
 - г) в количестве 4-5 капель
357. После введения капель в уши при отите
- а) следует надавить на мочку уха
 - б) следует надавить на козелок
 - в) ввести в ухо ватный тампон на 10-15 минут
 - г) тампон вводить не надо

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

358. Капли, вводимые в наружный слуховой проход, должны быть подогреты на водяной бане до (температура в °С)
- а) комнатной температуры (22-24)
 - б) температуры тела (36-37)
 - в) 38-40
359. При наличии гнойных выделений из уха для очистки в наружный слуховой проход закапывают
- а) вазелиновое масло
 - б) 3% раствор перекиси водорода
 - в) стерильную воду
360. После введения капель в ухо следует оставить голову ребенка в том же положении на
- а) 5 минут
 - б) 5-10 минут
 - в) 10-15 минут
 - г) 10-20 минут
361. Согревающий компресс на ухо состоит из слоев
- а) 1-го
 - б) 2-х
 - в) 3-х
 - г) 4-х
362. Согревающий компресс на ухо оставляют на
- а) 1-2 часа
 - б) 2-4 часа
 - в) 4-8 часов
 - г) 8-12 часов

363. Полуспиртовой компресс на область уха противопоказан при

- а) гнойном отите
- б) катаральном отите

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

364. При постановке согревающего компресса на ухо внутренняя марлевая салфетка

- а) состоит из 1-2 слоев
- б) состоит из 3-4 слоев
- в) на 2-3 см меньше продольного размера ушной раковины
- г) на 2-3 см больше продольного размера ушной раковины
- д) имеет разрез посередине
- е) разрез посередине не нужен

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

365. Внутренний слой согревающего компресса на ухо накладывается

- а) вокруг ушной раковины
- б) на ушную раковину

366. Наружный слой согревающего компресса на ухо накладывается

- а) вокруг ушной раковины
- б) на ушную раковину

367. При постановке согревающего компресса на ухо при отите внутреннюю салфетку следует смочить

- а) спиртом
- б) полуспиртовым раствором
- в) 9% раствором уксуса

368. Наружный слой согревающего компресса на ухо представляет собой слой ваты толщиной

- а) 1-2 см
- б) 2-3 см
- в) 3-5 см
- г) 5-7 см

369. При наличии отделяемого при конъюнктивите глаза очищают стерильным ватным тампоном, смоченным дезинфицирующим раствором

- а) от наружного угла глаза к внутреннему
- б) от внутреннего угла глаза к наружному
- в) от середины век к углам

370. При обработке глаз при конъюнктивите используют стерильный ватный тампон

- а) отдельный для каждого глаза
- б) один тампон на оба глаза

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

371. При введении капель в конъюнктивальный мешок используют пипетку

- а) с острым вытянутым концом
- б) с закругленным концом
- в) прокипяченную перед использованием
- г) промытую водой перед использованием

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

372. При введении капель в конъюнктивальный мешок нижнее веко следует оттянуть

- а) пальцами
- б) пальцами с помощью стерильного ватного тампона

373. Глазную пипетку при заполнении лекарственным раствором следует держать

- а) вертикально
- б) горизонтально
- в) наклонно

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

374. Закладывание мази за веко проводят

- а) во внутренний угол конъюнктивного мешка
- б) в наружный угол конъюнктивного мешка
- в) стеклянной палочкой предварительно прокипяченной
- г) стеклянной нестерилизованной палочкой
- д) с массажем закрытых век после закладки

375. Наиболее оптимальным способом введения лекарственных средств в дыхательные пути является

- а) пероральный
- б) парентеральный
- в) ингаляционный с формированием аэрозоля
- г) через прямую кишку

376. Оптимальная температура (в °С) аэрозоля для ингаляций у детей составляет

- а) 20-25
- б) 35-38
- в) 40-45

377. Устройство для преобразования жидкого лекарственного вещества в мелкодисперсный аэрозоль называется

- а) спейсер
- б) аппарат Боброва
- в) небулайзер

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

378. Небулайзер используют для ингаляционного введения лекарственных средств при

- а) бронхиальной астме
- б) отите
- в) пневмонии
- г) бронхите
- д) муковисцидозе

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

379. Спейсер – это

- а) лекарственное вещество
- б) приспособление для преобразования лекарственного вещества в аэрозоль
- в) приспособление для облегчения дозированного введения аэрозольных лекарственных веществ в дыхательные пути

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- 380. Назовите порядок обработки деталей небулайзера или спейсера после использования**
- а) замочить в дез. растворе
 - б) разобрать на составные части
 - в) высушить
 - г) промыть теплой проточной водой

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 381. Дозированный портативный аэрозольный ингалятор (ДАИ) – это устройство для ингаляций**
- а) щелочных растворов
 - б) ингаляционных бронходилататоров
 - в) ингаляционных глюкокортикоидов
 - г) растворов лекарственных трав

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 382. Ингалятор ДАИ дети старше 7-8 лет используют**
- а) самостоятельно
 - б) только с помощью медицинского персонала или родителей

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- 383. Назовите последовательность действий при использовании ингалятора ДАИ**
- а) встряхнуть ингалятор
 - б) сделать глубокий вдох, одновременно нажимая на дно ингалятора
 - в) снять колпачок с ингалятора
 - г) сделать выдох
 - д) на высоте вдоха после ингаляции задержать дыхание на 8-10 с
 - е) взять в рот мундштук ингалятора

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 384. Мазки из зева и носа на бактериологическое исследование берут стерильным**
- а) шпателем
 - б) тампоном на металлическом стержне
 - в) стеклянной палочкой

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 385. Взятие мазка из зева на бактериологическое исследование проводится**
- а) после завтрака
 - б) натощак
 - в) до чистки зубов
 - г) после приема лекарств

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

386. Симптомами сердечной недостаточности являются

- а) одышка
- б) головокружение
- в) цианоз кожи и слизистых оболочек
- г) учащение сердцебиений
- д) урежение сердцебиений
- е) отеки

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

387. Режим при заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначает

- а) лечащий врач
- б) старшая медицинская сестра
- в) постовая медицинская сестра

388. При постельном режиме физиологические отправления ребенок осуществляет

- а) в туалете
- б) на кровати в памперсы или на подкладном судне
- в) на горшке около кровати

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

389. При строгом постельном режиме ребенок не должен

- а) ходить в туалет
- б) принимать пищу за прикроватным столиком
- в) вставать с кровати на горшок
- г) принимать гигиеническую ванну

390. При постельном режиме ребенок может

- а) сидеть в постели
- б) вставать с кровати на горшок
- в) есть за столом в палате
- г) принимать гигиеническую ванну

391. При полупостельном режиме ребенку разрешается

- а) бегать по палате и коридору
- б) совершать физиологические отправления в туалете
- в) принимать пищу за столом в палате
- г) принимать гигиеническую ванну

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

392. Для облегчения состояния тяжелому больному с сердечной недостаточностью следует придать положение

- а) лежа на спине
- б) лежа на боку
- в) полусидя
- г) сидя

393. Аритмия – это

- а) различие пульса на двух руках
- б) одинаковые промежутки времени между пульсовыми толчками
- в) неодинаковые промежутки времени между пульсовыми толчками
- г) различие пульса на руках и ногах

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

394. Мед. сестра исследует пульс

- а) на лучевой артерии
- б) в покое
- в) при активном бодрствовании
- г) в течение 1 мин
- д) в течение 15-20 сек

395. Артериальное давление измеряют в положении

- а) сидя
- б) лежа
- в) стоя
- г) после 5-10 минут отдыха
- д) после 30-минутного отдыха

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

396. Систолическое артериальное давление рассчитывается у детей старше 1 года по формуле, где n – возраст в годах

- а) $60 + n$
- б) $90 + 2n$
- в) $60 + 2n$
- г) $90 + n$

397. Диастолическое артериальное давление можно рассчитать по формуле, где n – возраст в годах

- а) $90 + n$
- б) $90 + 2n$
- в) $60 + 2n$
- г) $60 + n$

398. Систолическое давление регистрируют при аускультации над локтевой артерией

- а) по исчезновению тонов при накачивании манжетки тонометра
- б) по исчезновению тонов при снижении давления в манжетке тонометра
- в) по появлению первых тонов при снижении давления в манжетке после накачивания

399. Диастолическое давление регистрируют при аускультации над локтевой артерией

- а) по появлению первых тонов при снижении давления в манжетке тонометра
- б) по полному исчезновению тонов при снижении давления в манжетке тонометра
- в) по исчезновению тонов при накачивании манжетки тонометра

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

400. Диета при сердечной недостаточности должна

- а) быть с умеренным ограничением белков и жиров
- б) содержать большое количество белков
- в) быть с ограничением количества выпитой жидкости
- г) учитывать количество выпитой и выделенной жидкости
- д) быть с ограничением количества поваренной соли
- е) быть с ограничением продуктов, богатых калием

- 401. Для облегчения состояния больного при сердечной недостаточности необходимо**
- поднять ножную часть кровати
 - поднять головную часть кровати
 - укрыть ребенка теплым, но легким одеялом
 - проводить кислородотерапию
 - проводить контрастные ножные ванны
- 402. Симптомами острой сосудистой недостаточности являются**
- резкая бледность кожи и слизистых оболочек
 - гиперемия кожи
 - слабость
 - холодная кожа конечностей
 - повышение температуры тела
 - потеря сознания
- 403. Доврачебная помощь больному при обмороке включает**
- создание горизонтального положения с приподнятой головой и грудью
 - создание горизонтального положения с головой, опущенной ниже ног
 - ослабление стягивающих частей одежды
 - обтирание кожи теплой водой
 - создание притока свежего воздуха
- 404. При обмороке до прихода врача больному необходимо**
- опрыскать лицо и грудь холодной водой
 - обтереть тело холодной водой
 - дать подышать парами нашатырного спирта
 - согреть тело грелками
 - обложить ноги пузырями со льдом
- 405. При коллапсе до прихода врача следует**
- удобно усадить больного
 - уложить больного горизонтально, приподняв ножной конец кровати
 - тепло укрыть больного
 - согреть больного грелками
 - обложить больного пузырями со льдом
 - подготовить набор для инъекций
- 406. Боли в области сердца у детей возникают**
- часто
 - редко
 - чаще из-за расстройства нервной регуляции
 - чаще из-за спазма венечных артерий
- 407. При пароксизмальной тахикардии у больного развиваются**
- частые сердцебиения
 - страх
 - головокружение
 - сдавление в груди
- 408. При приступе пароксизмальной тахикардии необходимо**
- сообщить врачу
 - напоить больного горячим чаем
 - подготовить все необходимое для введения лекарств
 - согреть больного грелками
 - использовать приемы, раздражающие блуждающий нерв
- 409. При проведении непрямого массажа сердца необходимо**
- уложить больного на кровать
 - уложить больного на твердую поверхность
 - надавливать ладонью на нижнюю треть грудины
 - надавливать ладонью на мечевидный отросток грудины
- 410. У новорожденных и детей первых месяцев жизни непрямым массаж сердца проводится**
- ладонью одной руки
 - двумя ладонями
 - большими пальцами обеих рук
 - указательным и средним пальцами одной руки (кончиками пальцев)
- УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ**
- 411. У детей старше 1 года непрямым массаж сердца проводится**
- ладонью одной руки
 - двумя ладонями
 - двумя большими пальцами рук
- 412. У новорожденных и грудных детей при непрямом массаже сердца смещение грудины должно быть (в см)**
- не более 1 - 2
 - не менее 1 - 2
 - не более 3 - 4
 - не менее 3 - 4
- 413. При непрямом массаже сердца у детей старше 1 года смещение грудины должно быть (в см)**
- 1-2
 - 2-3
 - 3-4
 - 4-6
- 414. У детей старшего возраста частота надавливаний на грудную клетку при проведении непрямого массажа сердца должна составлять в 1 минуту не менее**
- 30
 - 50
 - 70
 - 100
- 415. У детей 1-го года жизни частота надавливаний на грудную клетку при проведении непрямого массажа сердца должна составлять в 1 минуту не менее**
- 50
 - 70
 - 100
 - 100-150
 - 150-200
- УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ**
- 416. Об эффективности непрямого массажа сердца свидетельствуют**
- повышение температуры тела
 - повышение артериального давления
 - появление розовой окраски кожи и видимых слизистых оболочек
 - восстановление самостоятельного дыхания

УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

417. К симптомам, свидетельствующим о поражении органов пищеварения, относятся

- а) боли в горле
- б) боли в животе
- в) рвота
- г) кашель
- д) понос или запор

418. К диспепсическим симптомам относятся

- а) боли в животе
- б) рвота
- в) метеоризм
- г) понос
- д) повышение температуры тела

419. Помощь при рвоте ослабленному больному в лежачем положении включает

- а) поворот головы набок
- б) голову не поворачивать
- в) положение головы выше туловища
- г) положение головы ниже туловища
- д) поднесение лотка

420. После рвоты тяжелобольному ребенку следует

- а) прополоскать рот водой
- б) протереть лицо салфеткой
- в) дать выпить горячего чая
- г) дать выпить холодной воды

421. Помощь при метеоризме включает

- а) коррекцию питания с исключением продуктов, вызывающих метеоризм
- б) прием препаратов-абсорбентов
- в) введение газоотводной трубки
- г) выпаивание щелочной водой

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

422. Запор – это

- а) задержка стула в течение 36 часов
- б) задержка стула в течение 48 часов
- в) выделение плотных каловых масс малыми порциями

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

423. Помощь при запоре включает

- а) постановку очистительной клизмы
- б) назначение диеты №3
- в) назначение диеты №4
- г) по назначению врача дать слабительные препараты

424. Назовите ошибки в действиях медсестры при жалобах ребенка на боли в животе

- а) уложить ребенка в постель
- б) приложить к животу грелку
- в) вызвать срочно врача
- г) дать обезболивающий препарат
- д) поставить очистительную клизму и дать слабительное средство

425. Нормальный стул ребенка старше одного года должен быть

- а) полужидким
- б) оформленным
- в) жидким
- г) 1 раз в сутки
- д) от 2 до 5 раз в сутки
- е) коричневого цвета

426. К симптомам острой кишечной инфекции относятся

- а) рвота, понос
- б) одышка
- в) повышение температуры
- г) боли в животе
- д) запоры

427. К симптомам обезвоживания относятся

- а) нарастание массы тела
- б) потеря массы тела
- в) учащение мочеиспусканий
- г) жажда
- д) сухость кожи и слизистых

428. При острой кишечной инфекции стул

- а) водянистый
- б) оформленный
- в) непереваренный
- г) 1 раз в сутки
- д) 3-4 и более раз в сутки
- е) может иметь примесь зелени, слизи, крови

429. Элементами ухода за ребенком при поносе являются:

- а) подсчет числа испражнений и регистрация характера стула
- б) оставить испражнение и показать врачу
- в) стул врачу не показывать, а сразу отправить на анализ в лабораторию
- г) контроль потери массы тела
- д) перевод ребенка на дозированное питание по назначению врача

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И ВОДНОГО РАЦИОНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

430. В раствор для пероральной регидратации входят

- а) глюкоза
- б) хлористый кальций
- в) хлористый калий
- г) хлористый натрий
- д) сульфат магния
- е) бикарбонат натрия

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

431. Готовые порошки для пероральной регидратации разводят

- а) в 0,5 л воды
- б) в 1 л воды
- в) в 1 л фруктового сока

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 432. При язвенной болезни и обострении гастродуоденита назначается диета**
- а) физиологическая
 - б) механически и химически щадящая
 - в) с приемом пищи 3-4 раза в день
 - г) с приемом пищи 4-6 раз в день
 - д) с исключением соли
- 433. Диеты №№ 1, 1а, 1б отличаются**
- а) по способам кулинарной обработки пищи
 - б) по консистенции блюд
 - в) по перечню рекомендуемых и запрещенных блюд
- 434. В диете при язвенной болезни и обострении гастродуоденита запрещаются**
- а) свежий хлеб
 - б) мясо, рыба
 - в) капуста
 - г) яйца
 - д) лук, чеснок
 - е) кисели
 - ж) мед, варенье
 - з) бобовые
- 435. При острых и обострении хронических энтероколитов назначается диета**
- а) физиологическая
 - б) механически и химически щадящая
 - в) с учащением приемов пищи
 - г) с урежением приемов пищи
 - д) с уменьшением количества принимаемой жидкости
 - е) с увеличением количества принимаемой жидкости
- 436. При энтероколитах из диеты исключаются**
- а) мясо, рыба
 - б) молоко
 - в) бобовые
 - г) капуста
 - д) протертые каши
 - е) соленья, копчености

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 437. Детям с атоническими запорами исключают из диеты**
- а) легкоусвояемые продукты (сметана, каши и т. д.)
 - б) продукты, содержащие большое количество растительной клетчатки (капуста, свекла, чернослив, хлеб из муки грубого помола)
- 438. Детям со спастическими запорами исключают из диеты**
- а) легкоусвояемые продукты (сметана, каши и т. д.)
 - б) продукты, содержащие большое количество растительной клетчатки (капуста, свекла, чернослив, хлеб из муки грубого помола)

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 439. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей из диеты исключаются**
- а) лук, чеснок
 - б) овощи и зелень в сыром виде
 - в) овощи и зелень в отварном виде
 - г) репа, редька, редис
 - д) жареные мясо и рыба
 - е) паровые мясо и рыба

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 440. Кал для копрологического исследования собирают в**
- а) стерильную посуду
 - б) пробирку со специальным раствором
 - в) чистую сухую баночку
- 441. Кал для копрологического исследования желательно доставить в лабораторию после дефекации (время в часах)**
- а) сразу
 - б) через 2
 - в) через 4
 - г) через 6
- 442. Допускается хранение кала, собранного для копрологического исследования, в холодильнике при температуре (в °С)**
- а) 0
 - б) 3-4
 - в) 5-10
 - г) 11-15
- 443. Допускается хранение кала, собранного для копрологического исследования, в холодильнике в течение (время в часах)**
- а) 1-2
 - б) 4-6
 - в) 8-12
 - г) 12-18

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 444. Забор кала для исследования на яйца глистов и лямблии проводят**
- а) из одной порции кала
 - б) из разных порций кала
 - в) в пробирку со специальным раствором
 - г) в чистый сухой контейнер

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 445. Кал, собранный для исследования на яйца глистов и простейшие, необходимо доставить в лабораторию не позже, чем через (время в минутах)**
- а) 15
 - б) 30
 - в) 45
 - г) 60
 - д) 90

446. После сбора анализа кала на дисбактериоз биоматериал необходимо отправить в лабораторию в течение (время в часах)
- 1-3
 - 6-10
 - 12-24
447. Исследование на энтеробиоз проводится методом
- посева кала, собранного после дефекации
 - посева кала, собранного после очистительной клизмы
 - микроскопии соскоба кожи вокруг ануса
448. Забор кала для обнаружения кишечной группы возбудителей проводят трубочкой Циманна из горшка в
- чистую сухую банку
 - стерильную посуду
 - стерильную пробирку с питательной средой
449. Кал для копрологического исследования собирается после
- клизмы
 - применения ректальных свечей
 - применения слабительных препаратов
 - самостоятельной дефекации

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

450. При исследовании кала на скрытую кровь за 1-2 дня до сбора анализа из рациона исключают
- хлеб
 - мясо
 - творог
 - рыбу
 - фрукты

ТЕХНИКА МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

451. Очистительная клизма показана
- при поносе
 - при запоре
 - при подготовке к УЗИ или рентгенологическому исследованию ЖКТ
 - при кишечном кровотечении
 - перед введением лекарственных средств

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

452. При проведении очистительной клизмы ребенка укладывают
- на правый бок с подтянутыми к животу ногами
 - на левый бок с подтянутыми к животу ногами
453. Для очистительной клизмы используют
- теплую воду (35°C)
 - воду комнатной температуры (20°C)
 - горячую воду (50°C)
 - холодную воду (10°C)

454. Для очистительной клизмы используют
- кипяченую воду
 - некипяченую воду
 - воду с добавлением антисептического раствора
455. Детям первых лет жизни клизму делают с помощью
- резинового баллончика с мягким наконечником
 - резинового баллончика с твердым наконечником
 - кружки Эсмарха
456. Детям старшего возраста клизму делают с помощью
- резинового баллончика с мягким наконечником
 - резинового баллончика с твердым наконечником
 - кружки Эсмарха
457. При постановке клизмы наконечник смазывают
- водой
 - вазелиновым маслом
 - раствором хлоргексидина
 - не смазывают

НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

458. При постановке клизмы наконечник вводят в прямую кишку на расстояние
- Возраст
- Детям младшего возраста
 - Детям старшего возраста
- Глубина в сантиметрах
- 1-3
 - 3-5
 - 5-8
 - 8-10
459. При постановке очистительной клизмы разовый объем вводимой жидкости составляет
- Возраст
- 0-6 мес
 - 7-12 мес
 - 1-6 лет
 - 7-14 лет
- Объем жидкости (в мл)
- 1000-1500
 - 400-1000
 - 200-300
 - 100-150
 - 30-50
 - 10

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

460. После употребления резиновые баллоны и наконечники от клизм
- кипятят 15-20 минут
 - замачивают в дезинфицирующем растворе на 15-20 минут
 - промывают горячей водой

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

461. Масляные клизмы относятся к следующему виду клизм
- питательным
 - очистительным
 - лекарственным

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

462. При постановке масляной клизмы перед использованием масло

- а) подогревают до 25°C
- б) подогревают до 37°C
- в) оставляют комнатной температуры
- г) разводят водой
- д) ничем не разводят

463. При постановке масляной клизмы разовый объем масла берётся из расчёта на 1 год жизни (в мл)

- а) 5
- б) 10
- в) 15
- г) 20
- д) но не более 80

464. Масляным очистительным клизмам отдают предпочтение при

- а) необходимости быстрой очистки кишечника
- б) упорных запорах
- в) плотных каловых массах

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

465. При постановке масляной клизмы наконечник вводят в прямую кишку на глубину (в см)

- а) 2-3
- б) 5-7
- в) 7-10
- г) 10-12
- д) 12-15

466. При постановке гипертонической клизмы используется раствор хлорида натрия в концентрации (в %)

- а) 3-7
- б) 5-10
- в) 20-25

467. Гипертонические клизмы применяют при

- а) атонических запорах
- б) язвенных процессах в нижнем отделе толстой кишки
- в) воспалительных процессах в нижнем отделе толстой кишки

468. При постановке гипертонической клизмы разовый объем вводимого раствора в зависимости от возраста составляет (в мл)

- а) 10-30
- б) 50-70
- в) 100-150
- г) 150-200

469. Постановка сифонной клизмы относится к процедурам, которые проводит

- а) санитарка
- б) постовая медицинская сестра
- в) врач с помощью мед. сестры
- г) процедурная медицинская сестра

470. При постановке лекарственных клизм используется раствор с температурой (в° С)

- а) 15-20
- б) 25-30
- в) 40-41
- г) 42-45

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

471. При постановке лекарственной клизмы разовый объем берётся из расчёта на 1 год жизни (в мл)

- а) 5
- б) 10
- в) 15
- г) но не более 50-75

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

472. После лекарственной клизмы ребёнок должен оставаться в положении лёжа на животе не менее (время в минутах)

- а) 10
- б) 20
- в) 30
- г) 60

473. Перед постановкой лекарственной клизмы проводится

- а) очистительная клизма
- б) гипертоническая клизма
- в) очищение кишечника не требуется

474. Газоотводную трубку оставляют в прямой кишке на (время в минутах)

- а) 5-10
- б) 20-30
- в) 50-60
- г) 90-100

475. Газоотводную трубку, вводят в прямую кишку на глубину (см)

- а) 3-5
- б) 5-8
- в) 8-12

476. Повторно газоотводную трубку можно вводить через (время в часах)

- а) 1-2
- б) 3-4
- в) 4-6
- г) 10-12

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

477. После использования газоотводную трубку

- а) промывают горячей водой с мылом
- б) кипятят 15-20 минут
- в) замачивают в дезинфицирующем растворе

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

478. Для определения длины зонда при промывании желудка используется формула, где n – возраст в годах
- $20+n$
 - $30+n$
 - $10+2n$
479. Для ориентировочного определения длины зонда при промывании желудка у ребенка измеряется расстояние от переносицы до
- мечевидного отростка грудины
 - пупка
 - симфиза
480. Положение ребенка во время промывания желудка
- лежа
 - сидя
 - стоя
 - определяется тяжестью состояния
 - зависит от возраста
481. Для промывания желудка используют
- кипяченую воду
 - 2% раствор бикарбоната натрия
 - дистиллированную воду
482. Для промывания желудка следует приготовить
- воронку
 - желудочный зонд
 - кружку Эсмарха
 - таз для промывных вод

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

483. При промывании желудка зондовым способом следует
- налить в воронку жидкость для промывания
 - опустить воронку ниже уровня желудка и вылить содержимое
 - поднять воронку выше уровня желудка пока вода не дойдет до устья воронки
 - опустить воронку ниже уровня желудка
484. После использования (при промывании желудка) воронку, зонд, шприц
- кипятят 15-20 минут
 - замачивают в дезинфицирующем растворе
 - промывают сильной струей горячей воды

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

485. При промывании желудка первую порцию желудочного содержимого
- выливают
 - собирают в стерильную ёмкость
 - собирают в нестерильную банку
 - направляют в лабораторию для исследования
486. Для промывания желудка у детей старшего возраста используют зонд
- тонкий (3-5 мм)
 - толстый (0,5-1 см)
 - длиной 70-100 см
 - длиной 100-150 см

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

487. Количество жидкости для промывания желудка у детей 1-го года жизни составляет (в мл)
- 100-200
 - 300-500
 - 500-1000
 - 1000-1500

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

488. Количество жидкости для промывания желудка у детей после 1 года берётся из расчёта на 1 год жизни (в л)
- 0,5
 - 1
 - 2
 - не более 10

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

489. При промывании желудка необходимо следить, чтобы количество введённой жидкости
- было больше количества выделенной жидкости
 - было меньше количества выделенной жидкости
 - было примерно равно количеству выделенной жидкости
490. При проведении промывания желудка подтверждением того, что зонд находится в желудке, служит
- усиление рвотных движений
 - прекращение рвотных движений
491. Дуоденальное зондирование проводят
- после завтрака
 - утром натощак
 - после обеда

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

492. Для желудочного и дуоденального зондирования используют зонд
- тонкий (3-5 мм)
 - толстый (0,5-1 см)
 - длиной 70-100 см
 - длиной 100-150 см

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

493. Для ориентировочного определения длины зонда для дуоденального зондирования у ребенка измеряется расстояние
- от резцов до пупка
 - от угла нижней челюсти до резцов и далее до пупка
 - от резцов до симфиза
494. О нахождении зонда в двенадцатиперстной кишке при дуоденальном зондировании свидетельствует выделение содержимого
- бесцветного, слегка мутного или прозрачного
 - светло-желтого цвета
 - темно-коричневого цвета

ПОДГОТОВКА К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

495. При подготовке к рентгенологическому исследованию желудочно-кишечного тракта в день исследования ребенка

- а) не кормят до процедуры
- б) кормить можно
- в) не поят до процедуры
- г) поить можно
- д) ставят очистительную клизму перед исследованием
- е) ставят очистительную клизму не позднее, чем за 2 часа до исследования

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

496. Для проведения ирригоскопии контрастное вещество вводится через

- а) рот
- б) прямую кишку

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

497. При подготовке к эзофагогастродуоденоскопии в день исследования ребенка

- а) не кормят до процедуры
- б) кормить можно
- в) не поят до процедуры
- г) поить можно

498. При подготовке к колоноскопии

- а) ребенка не кормят ужином и завтраком
- б) ребенка не кормят только завтраком
- в) очистительную клизму ставят только утром
- г) очистительную клизму ставят дважды (вечером и утром)

499. При подготовке ребенка к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости

- а) накануне исследования назначают абсорбенты
- б) в день исследования ставят очистительную клизму
- в) вечером дважды ставят очистительную клизму
- г) за 2 дня до исследования исключают продукты, вызывающие метеоризм

500. При подготовке детей к инструментальным методам исследований органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта с целью уменьшения метеоризма за 2-3 дня до исследования из диеты исключают

- а) черный хлеб
- б) мясо
- в) молоко
- г) сырые овощи и фрукты
- д) блюда из капусты
- е) рис
- ж) гречу

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 501. Симптомы, характерные для нефрита**
- а) повышение АД
 - б) отеки
 - в) уменьшение количества выделяемой мочи
 - г) учащенные, болезненные мочеиспускания
 - д) недержание мочи
- 502. Симптомы, характерные для инфекции мочевой системы**
- а) повышение АД
 - б) отеки
 - в) учащенные, болезненные мочеиспускания
 - г) боли в животе или в области поясницы
 - д) повышение температуры
 - е) лейкоцитурия
- 503. Симптомы, характерные для почечной колики**
- а) приступообразные боли в эпигастрии
 - б) приступообразные боли в пояснице
 - в) приступообразные боли в боковых отделах живота
 - г) недержание мочи
 - д) появление гематурии на фоне или после приступа болей
- 504. Симптомы, характерные для острой задержки мочи**
- а) отсутствие самостоятельных мочеиспусканий
 - б) урежение мочеиспусканий
 - в) отсутствие позыва к мочеиспусканию
 - г) частые мучительные позывы к мочеиспусканию
- 505. У больных с нефритом медицинская сестра наблюдает за**
- а) состоянием артериального давления
 - б) состоянием кожи
 - в) диурезом
 - г) частотой пульса
 - д) частотой дыханий

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 506. Особенности водно-питьевого режима при нефрите (в острый период) являются**
- а) ограничение приема жидкости
 - б) обильное питье
 - в) питьевой режим обычный
- 507. Особенности водно-питьевого режима при инфекции мочевой системы являются**
- а) ограничение приема жидкости
 - б) обильное питье
 - в) питьевой режим обычный

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 508. Особенности диеты при нефрите (в острый период) являются**
- а) полное исключение соли
 - б) уменьшение количества соли
 - в) исключение из рациона мяса
 - г) мясо дают 2-3 раза в неделю
 - д) специальная диета не назначается

509. Особенности диеты при инфекции мочевой системы являются

- а) полное исключение соли
- б) исключение острых блюд
- в) исключение копченых блюд
- г) исключение жареных блюд
- д) исключение мяса

510. Особенности одежды у больных нефритом

- а) должна быть из натуральных тканей
- б) должна быть из синтетических тканей
- в) рекомендуется надевать шерстяные носки
- г) рекомендуется надевать хлопчатобумажные носки
- д) рекомендуется надевать шерстяной пояс на поясницу

511. Оказание доврачебной помощи ребенку с острой задержкой мочи включает

- а) катетеризацию мочевого пузыря
- б) наложение теплой грелки на область лобка
- в) проведение теплой ванны
- г) прием мочегонных препаратов
- д) вызов врача

512. Оказание доврачебной помощи больному с подозрением на почечную колику включает

- а) введение обезболивающих препаратов
- б) наложение пузыря со льдом на область поясницы
- в) проведение теплой ванны
- г) вызов врача

513. Ребенку с энурезом рекомендуется

- а) менять белье ежедневно
- б) менять белье по мере необходимости
- в) постелить на матрац под простыню клеенку
- г) постелить на простыню одноразовую впитывающую пеленку
- д) использовать памперсы

514. При энурезе медицинской сестре следует

- а) отругать, наказать ребенка, заставить стирать белье
- б) успокоить ребенка, поменять нательное и постельное белье
- в) оставить ребенка в «мокрое» виде до прихода врача
- г) сообщить лечащему врачу об эпизоде энуреза

515. При контроле за диурезом медицинская сестра ведёт учёт

- а) количества мочи, выделенной за сутки
- б) количества выпитой жидкости, включая жидкую пищу
- в) количества всей съеденной пищи
- г) объёма инфузионной терапии
- д) наличия рвоты, поноса

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

516. Перечислите последовательность действий при обработке мочеприемников и суден после их использования

- а) обработать дезинфицирующим раствором
- б) промыть горячей проточной водой с хозяйственным мылом
- в) вылить содержимое в канализацию
- г) сполоснуть проточной водой и высушить

**ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

517. При проведении пробы по Зимницкому необходимо
- контролировать соблюдение обычного питьевого режима
 - увеличить прием жидкости
 - ограничить прием жидкости
518. При проведении пробы по Зимницкому мочу собирают
- однократно утреннюю порцию
 - в течение суток через каждые 3 часа
 - в течение суток через каждые 4 часа
 - 3 раза в течение дня
519. Для пробы по Зимницкому необходимо приготовить следующее количество емкостей
- 4
 - 6
 - 8
 - 10
520. Первую порцию мочи в пробе по Зимницкому собирают в
- 6 часов
 - 9 часов
 - 12 часов
521. Для анализа по Нечипоренко количество мочи (в мл) должно быть не менее
- 1
 - 10
 - 50-100
522. Для общего клинического анализа количество мочи (в мл) должно быть не менее
- 1
 - 10
 - 50-100
 - 500
523. Мочу на общий клинический анализ и анализ по Нечипоренко собирают
- утром после сна (в 6 часов)
 - в 9 часов (утренняя порция в 6 часов выливается)
 - вечером перед сном
524. Перед сбором мочи на клинический анализ необходимо провести туалет наружных гениталий
- тёплой проточной водопроводной водой с мылом
 - стерильной водой с мылом
 - антисептиком для слизистых оболочек
 - проводить не обязательно

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

525. Перед сбором мочи для анализа на бактериурию необходимо провести туалет наружных гениталий
- тёплой проточной водопроводной водой с мылом
 - теплой кипяченой водой с мылом
 - антисептиком для слизистых оболочек
 - проводить не обязательно

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

526. Анализ мочи на бактериурию собирается в
- чистый горшок
 - простерилизованный открытый контейнер
 - в стерильный контейнер с крышкой
527. Моча должна быть доставлена в лабораторию после сбора
- сразу
 - в течение 30-60 минут
 - в течение 2-3 часов

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

528. Сбор мочи на анализы клинический и по Нечипоренко проводят
- во время свободного мочеиспускания
 - из средней порции струи мочи
 - с помощью мочевого катетера
 - из мочеприемника
529. Сбор анализа мочи на бактериурию проводят
- во время свободного мочеиспускания
 - из средней порции струи мочи
 - только с помощью стерильного катетера
 - из мочеприемника
530. При сборе мочи для определения экскреции солей мед. сестра должна
- собрать суточную мочу и измерить ее количество
 - собрать мочу за 12 часов и измерить ее количество
 - отправить в лабораторию суточный объем мочи
 - отправить в лабораторию объем мочи, собранный за 12 часов
 - отправить в лабораторию 80-100 мл мочи из суточного объема
531. Туалет наружных половых органов перед катетеризацией мочевого пузыря включает
- подмывание тёплой проточной водой с мылом
 - подмывание стерильной водой с мылом
 - обработку антисептиком для слизистых оболочек
 - проводить не обязательно
532. Для проведения катетеризации мочевого пузыря медицинская сестра должна приготовить
- лоток
 - стерильный катетер
 - пинцет
 - кружку Эсмарха
 - стерильное вазелиновое масло

**ПОДГОТОВКА К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ
МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ**

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 533. При подготовке ребенка к ультразвуковому исследованию (УЗИ) мочевого системы медицинская сестра должна**
- а) не кормить и не поить ребенка в день исследования
 - б) дать легкий завтрак
 - в) напоить перед исследованием до появления позыва к мочеиспусканию
 - г) очистительную клизму проводить по показаниям
 - д) очистительную клизму проводить обязательно
- 534. При подготовке ребенка к внутривенной экскреторной урографии медицинская сестра должна в день исследования**
- а) не кормить и не поить ребенка
 - б) дать легкий завтрак
 - в) поставить очистительную клизму накануне исследования (вечером)
 - г) поставить очистительную клизму утром перед исследованием
- 535. При подготовке ребенка к цистографии медицинская сестра должна в день исследования**
- а) не кормить и не поить ребенка
 - б) разрешить завтрак и питье
 - в) поставить очистительную клизму накануне исследования (вечером)
 - г) поставить очистительную клизму утром перед исследованием

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ПОВЫШЕННОЙ КРОВОТОЧИВОСТЬЮ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

536. При кровотечениях вне зависимости от причины больные должны находиться на режиме

- а) строгом постельном
- б) постельном
- в) полупостельном
- г) общем

537. Кормление детей с кровотечениями осуществляется

- а) в столовой
- б) в коридоре отделения
- в) в палате
- г) на пищеблоке

538. Транспортировка больных с кровотечениями осуществляется

- а) на кресле-каталке в сопровождении санитаря
- б) на кресле-каталке в сопровождении медицинской сестры
- в) дети идут самостоятельно в сопровождении матери или мать несёт ребенка на руках

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

539. После влажной уборки пола в отделении гематологии следует

- а) запретить передвижение по отделению в течение 1 часа
- б) запретить передвижение по отделению в течение 10-15 минут
- в) установить информационный щит «Осторожно! Мокрый пол!»
- г) вытереть пол насухо

540. Причинами носового кровотечения являются

- а) травмы
- б) заболевания, связанные с нарушением гемостаза
- в) снижение артериального давления
- г) местные заболевания полости носа

541. При носовом кровотечении ребёнка следует

- а) уложить в кровать в горизонтальном положении
- б) усадить в полусидячее положение с запрокинутой назад головой
- в) усадить в полусидячее положение, немного опустив голову вперёд
- г) приложить холод к переносице

542. На этапе оказания доврачебной помощи носовое кровотечение останавливают

- а) глубоким и частым дыханием через нос
- б) прижатием крыльев носа к носовой перегородке
- в) частым отсмаркиванием
- г) введением в одну или обе ноздри марлевого тампона
- д) прикладыванием холода к переносице

543. Для передней тампонады носа медицинская сестра должна приготовить

- а) вату
- б) марлевые турунды
- в) 1% синтомициновую эмульсию
- г) жгут

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

544. При обильном носовом кровотечении при заглатывании крови могут развиваться

- а) повышение температуры
- б) понос
- в) кашель и рвота
- г) судороги

545. При передней тампонаде носа тампон может находиться в полости носа не более

- а) 12 часов
- б) 1 суток
- в) 2 суток
- г) 3 суток

546. Тампон при передней тампонаде носа перед удалением лучше отмачивать

- а) физиологическим раствором
- б) водопроводной водой
- в) стерильным растительным маслом

547. После остановки кровотечения из лунки удалённого зуба разрешается приём пищи не ранее, чем через

- а) 30 минут
- б) 1 час
- в) 2 часа
- г) 1 сутки

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

548. Кровотечение из слизистых оболочек полости рта может возникнуть после

- а) травмы слизистой оболочки
- б) удаления зуба
- в) приступа кашля
- г) операции в полости рта

549. При кровотечении из слизистой оболочки полости рта пища должна быть

- а) тёплой
- б) охлаждённой
- в) полужидкой
- г) протёртой
- д) густой

550. На этапе оказания доврачебной помощи при лёгочном кровотечении больному надо

- а) придать горизонтальное положение
- б) придать полусидячее положение с высоко поднятым головным концом кровати
- в) успокоить, раздеть
- г) запретить движения и разговаривать
- д) обеспечить приток свежего воздуха

- 551. Признаками желудочно-кишечного кровотечения могут быть**
- лихорадка
 - кровь в стуле
 - кровь в моче
 - рвота кровью или «кофейной гущей»
 - сыпь на теле
- 552. Алая кровь в стуле свидетельствует о**
- кровотечении из нижних отделов толстой кишки
 - трещине заднего прохода
 - заглатывании крови при носовом кровотечении
 - кровотечении из тонкой кишки
- 553. Мелена, рвота «кофейной гущей» бывают при**
- кровотечении из толстой кишки
 - заглатывании крови при носовом кровотечении
 - кровотечении из желудка и тонкой кишки
- 554. На этапе оказания доврачебной помощи при желудочно-кишечном кровотечении больному необходимо**
- обеспечить полный покой
 - уложить в постели в положении на спине
 - напоить холодной водой или водой со льдом
 - не поить и не кормить
 - положить пузырь со льдом на верхнюю половину живота
- 555. Кормить ребёнка с желудочно-кишечным кровотечением можно**
- в первые часы после кровотечения
 - со вторых суток от начала кровотечения
 - только после разрешения врача
 - охлаждённой жидкой протёртой пищей
 - блюдами с общего стола
- 556. На этапе оказания доврачебной помощи при маточном кровотечении необходимо**
- обеспечить постельный режим
 - положить на низ живота пузырь со льдом
 - не поить и не кормить
 - подмывать по мере необходимости
 - подмывать запрещено

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

- 557. Размеры кровопотери при маточном кровотечении можно точно оценить**
- расспрашивая больную
 - собирая кровь в лоток
 - считая и взвешивая сухие прокладки
 - считая и взвешивая сухие и использованные прокладки с определением разницы в их массе

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

- 558. Причинами кровотечения из органов мочевыделительной системы могут быть**
- мочекаменная болезнь
 - заболевания мочевыделительной системы (например: цистит, гломерулонефрит)
 - энурез
 - травма органов мочевой системы

- 559. О кровотечении из органов мочевыделительной системы свидетельствует**
- отсутствие мочеиспусканий
 - затруднённые мочеиспускания
 - красный цвет мочи
 - гематурия в анализе мочи
 - недержание мочи

- 560. На этапе оказания доврачебной помощи при кровотечении из органов мочевыделительной системы необходимо**

- поставить мочевой катетер
- обеспечить ребёнку строгий постельный режим
- собирать мочу в горшок или мочеприёмник
- следить за цветом мочи, наличием в ней сгустков крови
- положить грелку на живот

- 561. При кровоизлияниях в суставы больному необходимо обеспечить**

- строгий постельный режим
- общий режим
- транспортировку на каталке с мягкой основой
- самостоятельное передвижение по отделению и на процедуры, но в сопровождении медсестры

ТЕХНИКА НЕКОТОРЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

562. Взвешивание детей до 2-х лет проводится на весах:

- а) механических лоточных
- б) электронных лоточных
- в) рычажных медицинских

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

563. При взвешивании детей пелёнку на лоточных весах меняют

- а) 1 раз в сутки
- б) 3 раза в сутки
- в) 1 раз в 3 дня
- г) после взвешивания каждого ребёнка

564. Лоточную часть весов и площадку рычажных весов обрабатывают дезинфицирующим раствором

- а) после взвешивания каждого ребёнка
- б) перед взвешиванием каждого ребёнка и после него
- в) 2 раза в сутки при уборке
- г) 1 раз в 2-3 дня

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

565. Желательно ребёнка взвешивать

- а) утром натощак
- б) утром после еды
- в) перед обедом
- г) после мочеиспускания и дефекации
- д) до мочеиспускания и дефекации

566. Длину тела детей грудного возраста измеряют

- а) стоя
- б) лёжа
- в) сидя

567. Рабочую поверхность ростомера необходимо обрабатывать дезинфицирующим раствором

- а) после каждого измерения
- б) до и после каждого измерения
- в) 1 раз в день
- г) 1 раз в 2-3 дня

568. На ростомере для детей старшего возраста имеются (количество шкал)

- а) 1
- б) 2
- в) 3
- г) 4

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

569. Пузырь со льдом используется при

- а) ушибах
- б) абсцессах
- в) кровотечениях
- г) гипертермии
- д) рвоте

570. Пузырь со льдом

- а) заполняют кусочками льда весь объём
- б) заливают водой температурой 4-6°C до полного объёма и замораживают в морозильной камере
- в) заполняют кусочками льда и заливают водой на $\frac{2}{3}$ объёма
- г) после использования обрабатывают дезинфицирующим раствором

571. Пузырь со льдом прикладывают

- а) обернув в чистое полотенце или ткань
- б) непосредственно на кожу
- в) на место поражения на 1 час и более
- г) на место поражения со сменой каждые 30-40 минут

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

572. Ёмкость резиновой грелки чаще составляет (в л)

- а) 0,5
- б) 0,5-1,0
- в) 1,0-1,5
- г) 1,5-2,0

573. Резиновую грелку заполняют водой температурой (°C)

- а) 40-50
- б) 50-60
- в) 60-70
- г) 70-90

574. Резиновую грелку заполняют горячей водой на (часть объёма)

- а) $\frac{1}{3}$
- б) $\frac{1}{2}$
- в) $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$
- г) в полном объёме

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

575. Резиновую грелку применяют

- а) как местную тепловую процедуру
- б) как местную охлаждающую процедуру
- в) для согревания участков тела
- г) как местное болеутоляющее средство
- д) для выпаивания пациента

576. Резиновую грелку

- а) меняют каждый час
- б) меняют каждые 2 часа
- в) убирают при температуре тела 37°C
- г) убирают при температуре тела 38°C
- д) после использования обрабатывают дезинфицирующим раствором
- е) после использования обрабатывать дезинфицирующим раствором не нужно

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

577. Лечебную ванну назначает

- а) врач
- б) старшая медицинская сестра
- в) палатная медицинская сестра

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

578. В зависимости от температуры воды различают следующие виды лечебных ванн

- а) холодные
- б) прохладные
- в) индифферентные
- г) тёплые
- д) распаривающие
- е) горячие

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

579. Холодная лечебная ванна имеет температуру воды (°С) ниже

- а) 20
- б) 25
- в) 30
- г) 35

580. Прохладная лечебная ванна имеет температуру воды (°С)

- а) 15-20
- б) 25-30
- в) 30-33
- г) 35-38

581. Индифферентная лечебная ванна имеет температуру воды (°С)

- а) 30
- б) 35
- в) 37
- г) 40

582. Тёплая лечебная ванна имеет температуру воды (°С)

- а) 37
- б) 38
- в) 39
- г) 40

583. Горячая лечебная ванна имеет температуру воды (°С)

- а) 37
- б) 39
- в) 40
- г) 43

УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

584. При проведении ножной горячей ванны

- а) начинают с температуры воды 30-35°С
- б) начинают с температуры воды 36-37°С
- в) доводят температуру воды до 38°С
- г) доводят температуру воды до 40°С
- д) длительность процедуры 5-10 минут
- е) длительность процедуры 10-15 минут