

ТЕСТЫ ПО ЧЛХ И ГНАТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Вопрос № 1

Укажите основные симптомы одонтогенной флегмоны поднижнечелюстной области:

- A. болезненный инфильтрат в позадичелюстной ямке
- B. воспалительная контрактура II-III степеней
- C. болезненный инфильтрат в поднижнечелюстной области
- D. гиперемия кожных покровов в поднижнечелюстной области
- E. наличие флюктуации в подъязычной области

Правильный ответ-С

Вопрос № 2

Укажите симптомы одонтогенных флегмон подвисочной и крылонебной ямок:

- A. увеличение и болезненность регионарных лимфоузлов
- B. болезненный инфильтрат в поднижнечелюстном треугольнике
- C. воспалительная контрактура I-II степеней
- D. гиперемия кожных покровов скуловой области
- E. болезненный инфильтрат в области бугра верхней челюсти

Правильный ответ-Е

Вопрос № 3

Укажите основным симптом одонтогенных флегмон околоушно-жевательной области:

- A. инфильтрат в околоушно-жевательной области
- B. гиперемия кожных покровов в околоушно-жевательной области
- C. гнойное отделяемое из устья выводного протока околоушной слюнной железы
- D. воспалительная контрактура II-III степеней
- E. инфильтрат в поднижнечелюстном треугольнике

Правильный ответ-А

Вопрос № 4

Укажите основным симптом одонтогенных флегмон окологлоточного пространства:

- A. воспалительная контрактура I-II степеней
- B. припухлость щечной области
- C. болезненный инфильтрат под углом нижней челюсти
- D. болезненное затрудненное глотание
- E. суженность зева за счет выбухания боковой стенки глотки

Правильный ответ-D

Вопрос № 5

Укажите основным симптом одонтогенных флегмон крыловидно-челюстного пространства:

- A. припухлость щечной области
- B. болезненный инфильтрат под углом нижней челюсти
- C. болезненный инфильтрат в области крыловидно-челюстной складки
- D. покраснение кожи в поднижнечелюстной области

Е. воспалительная контрактура III степени

Правильный ответ-С

Вопрос № 6

Укажите основной симптом одонтогенных флегмон позадичелюстной области:

- А. припухлость щечной области
- В. болезненный инфильтрат в позадичелюстной ямке
- С. сужение наружного слухового прохода
- Д. болезненный инфильтрат в области крыловидно-челюстной складки
- Е. воспалительная контрактура III степени

Правильный ответ-В

Вопрос № 7

Укажите основной симптом одонтогенных флегмон дна полости рта:

- А. полуоткрытый рот, отечность языка, его смещение кверху и кзади
- В. болезненный инфильтрат в области дна полости рта
- С. припухлость щечной области
- Д. воспалительная контрактура I-II степеней
- Е. вынужденное положение больного из-за затрудненного дыхания

Правильный ответ-В

Вопрос № 8

Определите лечебные мероприятия больным с одонтогенными флегмонами при поступлении в стационар:

- А. назначение антибактериальных препаратов
- В. лечение причинного зуба
- С. вскрытие флегмоны
- Д. удаление причинного зуба

Правильный ответ- С

Вопрос № 9

Укажите флегмону, при которых применяются внеротовые разрезы:

- А. подъязычной области
- В. подвисочной ямки
- С. челюстно-язычного желобка
- Д. поднижнечелюстной области
- Е. подглазничной области

Правильный ответ- D

Вопрос № 10

Затруднение при глотании появляется при флегмоне:

- А. височной
- В. скуловой
- С. щечной области
- Д. дна полости рта
- Е. околоушно-жевательной

Правильный ответ-D

Вопрос № 11

Затруднение при глотании появляется при флегмоне:

- A. височной
- B. скуловой
- C. щечной области
- D. околоушно-жевательной
- E. окологлоточного пространства

Правильный ответ-Е

Вопрос № 12

Типичным клиническим признаком флегмоны подвисочной области является:

- A. симптом "песочных часов"
- B. отек губо-щечной складки и подподбородочной области
- C. отек и гиперемия щечной области
- D. гиперемия кожи в области нижней губы
- E. инфильтрат мягких тканей в поднижнечелюстной области

Правильный ответ-А

Вопрос № 13

Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне височной области чаще всего бывает абсцесс:

- A. в клыковой ямке
- B. в щечной области
- C. в крыловидно-небной ямке
- D. в подподбородочной области
- E. в поднижнечелюстной области

Правильный ответ-С

Вопрос № 14

Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне височной области чаще всего бывает абсцесс:

- A. в клыковой ямке
- B. в щечной области
- C. в подподбородочной области
- D. в поднижнечелюстной области
- E. в окологлоточном пространстве
- F. в подвисочной ямке

Правильный ответ-F

Вопрос № 15

Признаком перфорации дна верхнечелюстной пазухи является:

- A. носовое кровотечение
- B. кровотечение из лунки
- C. перелом альвеолярного отростка
- D. выделение из лунки пенистой крови

Правильный ответ-D

Вопрос № 16

Одонтотгенной причиной развития абсцесса и флегмоны языка является

воспалительный процесс в области:

- А. верхней губы
- В. зубов нижней челюсти
- С. зубов верхней челюсти
- Д. лимфоузлов щечной области
- Е. лимфоузлов околоушной области

Правильный ответ-В

Вопрос № 17

Наиболее частой неodontогенной причиной развития абсцесса и флегмоны языка является:

- А. травма языка
- В. фурункул нижней губы
- С. лимфаденит щечной области
- Д. лимфаденит околоушной области
- Е. острый периодонтит зубов нижней челюсти

Правильный ответ-А

Вопрос № 18

Неodontогенной причиной развития ангины Людвига является воспалительный процесс в области:

- А. верхней губы
- В. небных миндалин
- С. зубов верхней челюсти
- Д. лимфоузлов щечной области
- Е. лимфоузлов околоушной области

Правильный ответ-В

Вопрос № 19

Характерной особенностью клинической картины ангины Людвига является поражение:

- А. височной и подвисочной областей
- В. височной, щечной областей и клыковой ямки
- С. всех клетчаточных пространств дна полости рта
- Д. крыловидно-небной, височной и подвисочной областей
- Е. крыловидно-небной, височной, подвисочной и крыловидно-нижнечелюстной областей

Правильный ответ-С

Вопрос № 20

Укажите основное лечебное мероприятие при остром одонтогенном гайморите:

- А. промывание пазухи растворами антисептиков
- В. радикальная гайморотомия
- С. назначение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов
- Д. удаление причинного зуба
- Е. закапывание сосудосуживающих препаратов в нос

Правильный ответ-А

Вопрос № 21

Для репозиции скуловой кости при ее переломе применяют:

- A. распатор
- B. зажим Кохера
- C. крючок Фарабефа
- D. крючок Лимберга.

Правильный ответ-D

Вопрос № 22

Укажите правильную последовательность формирования рубца:

- A. набухание, уплотнение, эпителизация, размягчение
- B. уплотнение, эпителизация, набухание, размягчение
- C. эпителизация, набухание уплотнение, размягчение
- D. эпителизация, уплотнение, набухание, размягчение.

Правильный ответ-C

Вопрос № 23

Минипластины к отломкам челюстей фиксируют:

- A. спицей
- B. шурупами
- C. проволочной лигатурой
- D. костным клеем.

Правильный ответ-B

Вопрос № 24

Основные симптомы перелома скуловой кости:

- A. гематома скуловой области
- B. деформация носа, гематома
- C. кровоизлияние в нижнее веко
- D. симптом «ступени», затрудненное открывание рта.

Правильный ответ-D

Вопрос № 25

Если один ранящий агент у одного раненого повреждает несколько органов, то ранение называется:

- A. одиночное
- B. множественное
- C. сочетанное
- D. комбинированное.

Правильный ответ-C

Вопрос № 26

Метод предупреждения развития раневой инфекции в огнестрельной ране:

- A. ранняя хирургическая обработка
- B. промывание раны антисептическими растворами
- C. назначение антибактериальных средств
- D. назначение противовоспалительных средств.

Правильный ответ-А

Вопрос № 27

Для иммобилизации переломов беззубых челюстей применяется шина:

- A.Порта
- B.Ванкевич
- C.Тигерштедта
- D. Лимберга.

Правильный ответ-А

Вопрос № 28

Хирургические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:

- A.дуга Энгля
- B.метод Адамса
- C.остеосинтез по Макиенко
- D. наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой.

Правильный ответ-С

Вопрос № 29

У больного имеется пулевое ранение, а также повреждение кожи от воздействия боевыми отравляющими веществами. Назовите это ранение:

- A. одиночное
- B. множественное
- C. сочетанное
- D. комбинированное.

Правильный ответ-D

Вопрос № 30

Минипластины для остеосинтеза переломов челюстей изготавливаются из:

- A.стали
- B.бронзы
- C.титана
- D.алюминия.

Правильный ответ-С