

31.05.03 Стоматология. Специалитет		
1	Кафедра	Ортопедической стоматологии
2	Заведующий кафедрой	Проскокова С.В., д.м.н., профессор
3	Заведующий учебной частью	Кутузов Д.Н., к.м.н., доцент
4	Учебная дисциплина	Протезирование на имплантатах
5	Учебный год составления	2022-2023
6	Специальность	Стоматология
7	Тип вопросов	Вопросы с одиночным выбором
8	Количество вопросов	25

1		Препарирование цилиндрические специально предназначенными для этого сверлами со следующей скоростью вращения, об/мин...
		А) 200-300
	*	Б) 500-800
		В) 1000-1500
		Г) 3000-5000
2		Чем определяется усилие затягивание винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату...
		А) Тактильными ощущениями врача
		Б) Степенью подвижности супраструктуры
	*	В) Инструкциями по применению элементов системы имплантатов
		Г) Показаниями динамометрического ключа
3		Основоположником и разработчиком имплантатов пластиночной конструкции считается...
		А) карл миш
		Б) марсель миргазизов
		В) пер-ингвар бранемарк
	*	Г) леонард линков
4		Что такое абатмент...
	*	А) супраструктура
		Б) Переходный модуль
		В) Аналог имплантата
		Г) Фиксирующий винт
5		Для изготовления зубного протеза на имплантатах проводят получение оттисков...

		А) Стандартной жесткой ложкой коррегирующим слоем силиконовой массы
		Б) Гипсом с индивидуальной жесткой ложкой
		В) Альгинатной слепочной массой стандартной жесткой ложкой
	*	Г) Индивидуальной жесткой ложкой силиконовой или полиэфирной массой
		Открытым или закрытым способом
6		Согласно определению европейской пародонтологов, периимплантит – это...
	*	А) Прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях
		Окружающих имплантат
		Б) Воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат
		В) Очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной
		Г) Образование грануляционной ткани между костью и поверхностью
		Имплантата
7		Для двухэтапной имплантации наиболее вероятный период между первым и вторым этапом составляет...
		А) 2 месяца
		Б) От 3 до 6-ти месяцев
	*	В) От 1,5 года до 2-х лет
		Г) От 6 месяцев до 1,5 года
8		Для изготовления зубного протеза на имплантатах проводят получение оттисков...
		А) Индивидуальной ложкой и термопластической массой
		Б) Гипсом с индивидуальной жесткой ложкой
		В) Альгинатной слепочной массой стандартной жесткой ложкой
	*	Г) Индивидуальной жесткой ложкой силиконовой или полиэфирной массой
		Открытым или закрытым способом
9		Возможно ли поставить пластиночный имплант во фронтальном отделе челюсти?
		А) да
	*	Б) нет
		В) Только с согласия пациента
10		Для изготовления несъемной ортопедической конструкции с винтовой фиксацией применяются:
	*	А) Индивидуальный абатмент
		Б) Стандартный абатмент
		В) Угловой абатмент
11		Какую оттискную массу используют при снятии оттисков при протезировании с опорой на импланты?
		А) Альгинатные материалы
		Б) Термопластическую массу
	*	В) Поливинилсилоксановые, полиэфирные материалы
12		При полном отсутствии зубов на верхней челюсти для изготовления несъемной конструкции необходима постановка:
		А) 2-4 имплантата
		Б) 4-6 имплантатов
		В) 6-8 имплантатов

	*	Г) 8-10 имплантатов
13		При полном отсутствии зубов на нижней челюсти для изготовления несъемной конструкции необходима постановка:
		А) 2-4 имплантата
		Б) 4-6 имплантатов
	*	В) 6-8 имплантатов
		Г) 8-10 имплантатов
14		Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантаты могут быть причиной:
		А) Ограниченное открывание рта
		Б) Очаговый гингивит
	*	В) Перелом винта, фиксирующего абатмент
15		Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантаты могут быть причиной:
		А) Ограниченное открывание рта
	*	Б) Скол керамической облицовки протеза
		В) пародонтит
16		Наиболее вероятное минимальное расстояние между имплантатами...
	*	А) 2 мм
		Б) 3 мм
		В) 4 мм
		Г) 5 мм
		Д) 3,5 мм
17		Наиболее вероятное значение слепочного трансфера...
		А) Обычно его называют имплантатом, она находится внутри кости
		Б) Временно устанавливается на имплантат для формирования контура Десны
		В) Является опорно-соединительным элементом между имплантатом и Полостью рта
	*	Г) Используется для снятия оттиска с имплантата с последующим изготовлением модели
18		Субпериостная имплантация показана, когда есть:
		А) Двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
		Б) Дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
		В) Концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
	*	Г) Резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
19		Наиболее вероятное значение абатмента...
		А) Обычно его называют имплантатом, она находится внутри кости
		Б) Препятствует врастанию кости во внутреннюю часть имплантата
		В) Временно устанавливается на имплантат для формирования контура Десны
	*	Г) Является опорно-соединительным элементом между имплантатом и Полостью рта

20		Наиболее вероятное значение винт-заглушки...
		А) Обычно его называют имплантатом, она находится внутри кости
	*	Б) Препятствует врастанию кости во внутреннюю часть имплантата
		В) Временно устанавливается на имплантат для формирования контура Десны
		Г) Является опорно-соединительным элементом между имплантатом и Полостью рта
21		Что означает термин «первичная стабилизация имплантата»? Наиболее вероятное значение...
		А) Физиологическая подвижность имплантата
	*	Б) 1-й день после операции – подвижности нет
		В) 21-й день после операции – подвижности нет
		Г) 14-й день после операции – подвижности нет
22		О чем свидетельствует эффект «проваливания» при формировании ложа имплантата на верхней челюсти
		А) О перфорации верхнечелюстной пазухи
		Б) О перфорации полости носа
		В) О перфорации поднутрения стенки альвеолярного отростка
	*	Г) О выходе инструмента за пределы костной ткани
23		Контактный остеогенез – это...
		А) Процесс регенерации костной ткани вокруг имплантата
	*	Б) Процесс регенерации костной ткани непосредственно на поверхности Имплантата
		В) Восстановление участков кости после травмы
		Г) Неадекватная минерализация органического костного матрикса при Сохраняющейся в норме скелетной массе
24		Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах:
	*	А) Использование благородных металлических сплавов
		Б) Протез должен передавать нагрузку на имплантат по его горизонтальной оси
		В) Использование разнородных металлических сплавов
25		Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах:
		А) Протез должен передавать нагрузку на имплантат по его горизонтальной оси
		Б) Использование разнородных металлических сплавов
	*	В) Протез должен передавать нагрузку на имплантат по его вертикальной оси

