

3.05.03 [Стоматология. Специалитет](#)

1	Кафедра	Ортопедической стоматологии
2	Заведующий кафедрой	Проскокова С.В., д.м.н., профессор
3	Заведующий учебной частью	Кутузов Д.Н., к.м.н., доцент
4	Учебная дисциплина	Сложное протезирование
5	Учебный год составления	2022-2023
6	Специальность	Стоматология
7	Тип вопросов	Вопросы с одиночным выбором
8	Количество вопросов	25

Список тестовых заданий

1			«Зоны безопасности» (Н. Аболмосов и Е. Гаврилов) у верхних и нижних резцов располагаются в области:		
			Контактных поверхностей на уровне шейки		
			Контактных поверхностей на уровне экватора		
	*		Режущего края		
			Оральной и вестибулярной поверхностей на уровне шейки		
			Оральной вогнутости коронки между бугорком и режущим краем		
2			К какому классу относится двусторонний концевой дефект по классификации Кеннеди:		
	*		I		
			II		
			III		

			VI		
3			Бюгельный протез передает жевательное давление на:		
			естественные зубы		
			жевательные мышцы		
	*		слизистую оболочку полости рта и естественные зубы		
			височно-нижнечелюстной сустав		
4			Дуга бюгельного протеза располагается относительно слизистой оболочки:		
	*		никогда не касаясь		
			всегда слегка касаясь		
			всегда плотно прилегая		
			слегка касаясь при жевании		
5			Припасовка литого каркаса бюгельного протеза производится:		
	*		зубным техником на модели, затем врачом в полости рта		
			только врачом в полости рта		
			врачом только на модели		
			только зубным техником на модели		
6			Первая коррекция бюгельного протеза производится:		
	*		на следующий день после наложения протеза		
			в день наложения протеза		
			через неделю после наложения протеза		
			через месяц		

7			В бюгельных протезах применяются кламмеры, изготовленные методом:		
	*		литья		
			штамповки		
			ковки		
			изгибания		
8			Плечо литого кламмера в бюгельном протезе выполняет функцию:		
	*		удерживающую		
			опорную		
			направляющую		
			удерживающую и опорную		
9			Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти располагается:		
			у шеек зубов		
	*		между шейками зубов и переходной складкой дна полости рта		
			у переходной складки дна полости рта		
			между шейками зубов и окклюзионной поверхностью		
10			Каркас бюгельного протеза состоит из:		
	*		дуги, кламмеров, ответвлений		
			дуги, кламмеров		
			дуги, ответвлений		
			дуги, кламмеров, ответвлений, базиса		

11			При изготовлении бюгельного протеза после определения центральной окклюзии и параллелометрии следует клинический этап:		
	*		припасовка каркаса бюгельного протеза		
			проверка конструкции бюгельного протеза с искусственными зубами		
			припасовка и наложение бюгельного протеза		
			моделировка каркаса бюгельного протеза		
12			Причинами непригодности каркаса бюгельного протеза является:		
			ощущение во рту инородного тела при припасовке и наложении каркаса		
			большая протяженность каркаса и сложность его конструкции		
	*		отсутствие зазора между дугой и слизистой оболочкой		
			появление повышенной саливации		
13			После клинического этапа «Припасовка каркаса бюгельного протеза»		
			замена воска на пластмассу		
	*		постановка искусственных зубов		
			гипсовка моделей в артикулятор		
			параллелометрия		
14			Обучение пациента правилам пользования бюгельным протезом осуществляется:		
			1. коррекции протеза		
			2. проверки конструкции протеза		

			3. припасовки каркаса		
	*		4. припасовки и наложения протеза		
15			Бюгельный протез относится к		
			шарнирным протезам		
			мостовидным протезам		
			полным съемным протезам		
	*		частичным съемным протезам		
16			Является ли состояние умеренного алкогольного опьянения у больного противопоказанием к бюгельному протезированию?		
			категорически противопоказано		
			не является		
	*		на усмотрение врача стоматолога		
			зависит от концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе		
17			Бюгельный протез может являться шинирующей конструкцией при		
			подвижности зубов 3 степени		
			зубоальвеолярном выдвигении — неверно		
			рецессии десны		
	*		подвижности зубов -2 степени		
18			Отдаленная причина полной несостоятельности бюгельного протеза при сахарном диабете:		
			реакция слизистой на металл — неверно		

			усталость металла		
	*		выпадение опорных зубов у больного		
			стирание зубов в седловидной части протеза		
19			Панорамная рентгенография обеих челюстей перед бюгельным протезированием нужна для		
			психологической подготовки больного		
	*		для выявления оставшихся корней в альвеолярном отростке под		
			будущим базисом протеза		
			для документального обоснования протезирования		
20			Ретенционные свойства бюгельного протеза обусловлены наличием:		
			окклюзионных накладок		
	*		опорно-удерживающих кламмеров		
			металлической дуги		
			седловидной части		
21			Невралгия тройничного нерва может являться противопоказанием к бюгельному протезированию при		
			наличии частых приступов		
			подозрении на невралгию у больного		
			наличии справки о диагнозе «невралгия тройничного нерва»		
	*		наличии болевой зоны в области ложа протеза		
22			В каком возрасте можно ставить бюгельный протез?		

			в 20-40 лет		
			свыше 70 лет		
	*		в любом		
			40-60 лет		
23			При аллергической реакции на кобальт-хромовый базис бюгельного протеза можно ее избежать путем:		
			приема десенсибилизирующих средств		
	*		замены кобальт-хрома на золотой сплав		
			выявления причины аллергической реакции организма		
			замены кобальт-хрома на никель-хром		
24			Можно ли при паркинсонизме использовать замковые крепления на бюгельном протезе?		
			только после инструктажа больного		
	*		противопоказано		
			при согласии больного		
			можно во всех случаях		
25			Минимальное число зубов для бюгельного протезирования:		
			-2 зуба		
	*		5-6 зубов		
			0-2 зубов		
			3-4 зуба		