



КАКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ,  
НО ПРЕДОТВРАТИМЫ?


ВЕТРЯНАЯ ОСПА



КРАСНУХА



КОРЬ



ПАРОТИТ



ПАТОГИТ А




ГЕПАТИТ В



ТУБЕРКУЛЕЗ



КОКЛЮШ



ВРЧ

Ходи **первым** -  
сделай прививку!



НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИ РИСКИ?


С точки зрения соотношения потенциальной пользы и потенциального вреда, полезность вакцин для общества в целом и для каждого человека, в частности, 100-, а иногда 1 000-кратно превышает возможные риски, связанные с проведением профилактической прививки.

Да, действительно, риски остаются, **НО** возникают они значительно реже в сравнении с опасностью развития осложнений после перенесённой инфекции.

А приём любого препарата, будь то с лечебной или профилактической целью, в том числе гомеопатических средств, БАД, витаминов и т.д. сопровождается риском побочных реакций и осложнений. Наиболее опасные случаи связаны с развитием индивидуальной непереносимости в виде анафилактического шока (очень сильно выраженной быстро развивающейся аллергической реакции), нередко заканчивающегося гибелью пациента.

Если оценивать медицинские препараты, с точки зрения частоты причинения вреда человеку, то лидером окажутся вовсе не вакцины, а... всем известный жаропонижающий препарат Парацетамол (ацетаминофен).

Что касается случаев тяжёлых аллергических (анафилактических) реакций, то и здесь вакцины далеко не в лидерах. Частота этих серьёзных осложнений при любой вакцинации не превышает 1 случая на 1 миллион доз вакцины, тогда как инъекционное применение антибиотиков пенициллинового или цефалоспоринового ряда осложняется анафилаксией в 1 случае из 5 000 введённых доз. Тромбоцитопения при прививках против кори-краснухи-паротита встречается с частотой 1 случай на 40 000 доз вакцины, а при приёме бисептола — с частотой 198 случаев на 100 000 человек в год.




ПОЛИОМИЕЛИТ




ДИФТЕРИЯ




СТОЛБНЯК



ГРИПП





РОТАВИРУС



КОРОНАВИРУС

ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
ТИПА В



КЛЕШЕВОЙ  
ЭНЦЕФАЛИТ



ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ